

گشتاورها در زنجیر مارکوف

سید محمود میرخان^۱

چکیده

یکی از مهمترین مباحث در زنجیرهای مارکوف محاسبه میانگین و واریانس تعداد گامها تا رسیدن به مکان مورد نظر است. در این مقاله ابتدا حالت کلی تعداد گامها تا رسیدن به مجموعه مکانهای مورد نظر بدون دیدار از مجموعه مکانهایی دیگر معرفی شده، سپس میانگین، گشتاورهای r ام و تابع مولد گشتاور آن تعریف شده اند. برای محاسبه این مقادیر در زنجیرهای مارکوف ارگودیک، روش تحلیلی با استفاده از دستگاه معادلات بازگشتی و روش مبتنی بر محاسبه ماتریسی بیان شده است. هر یک از این روشها نه تنها شیوه محاسباتی قبل را تعمیم داده بلکه روابطی جدید و ساده تر ارائه می کند. در انتها موارد فوق را برای زنجیرهای مارکوف تحویل پذیر به مکانهای گذرا و بازگشتی بیان می کنیم. جهت درک بهتر روابط بیان شده در این مقاله، مثالهایی متنوع و جالب همراه با برنامه های کامپیوتری نرم افزار Matlab ارائه شده است.


واژه های کلیدی: زنجیر مارکوف - امید ریاضی - گشتاورها - تابع مولد گشتاور - نرم افزار Matlab

۱. مقدمه

برای شروع بحث به مثال زیر توجه کنید.

مسئله ۱) گراف زیر را در نظر بگیرید.

فرض کنید یک ذره با شروع از یک گره (یا راس) بتواند با احتمال یکسان به تعداد یالهای آن گره به گره های مجاور آن گام بردارد. به این نوع حرکت گام زدن تصادفی روی گراف می گویند. اگر X_n مکان ذره در گام n ام باشد ماتریس انتقال آن به صورت زیر می گردد.



$$P = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix} \quad S = \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

اگر ذره از مکان (در اینجا گره) ۲ شروع به حرکت کند میانگین و واریانس تعداد گامهای ذره برای رسیدن به مکان ۳ قبل از دیدار مکان ۴ چه هستند؟

جهت حل مسائلی از این قبیل برای زنجیر مارکوف $\{X_n, n \geq 0\}$ ابتدا متغیرهای تصادفی زیر را تعریف می کنیم. فرض کنید:

$$T_{C_i} = \min\{n \geq 1, X_n \in C_i\}$$

تعداد گامها تا اولین دیدار مجموعه مکانهای C_i ,

$$T_{xC_i}$$

تعداد گامها تا اولین دیدار مجموعه مکانهای C_i با شروع از مکان x

و

$$C_j T_{xC_i}$$

تعداد گامها تا اولین دیدار مجموعه مکانهای C_i با شروع از مکان x بدون دیدار مجموعه مکانهای C_j باشد که در آنها $i, j = 1, 2, \dots, m$ و $i \neq j$ هستند.

مقادیر احتمال، امید ریاضی، واریانس، گشتاورهای r ام و تابع مولد گشتاور متغیر تصادفی فوق به ترتیب عبارت اند از:

$$P_x(T_{C_i} < T_{C_j}) = P(C_j T_{xC_i} < \infty) =$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} P(C_j T_{xC_i} = k) = C_j f_{xC_i} = \sum_{k=1}^{\infty} C_j f_{xC_i}^k$$

روی گراف و محاسبه میانگین تعداد دور بازی تا ورشکستگی یک بازیکن اشاره کرد. لازم به ذکر است که روابط بیان شده در این مقاله بسیار ساده تر و مناسبتر از روابط ارائه شده در منابع فوق بوده که برای حالت‌های خاص به کار رفته است.

۲. گشتاورها در زنجیر ارگودیک

فرض کنید زنجیر مارکوف $\{X_n, n \geq 0\}$ تحویل ناپذیر بازگشتی مثبت (ارگودیک) باشد. در آن صورت داریم:

لم ۱) برای زنجیر مارکوف ارگودیک $\{X_n, n \geq 0\}$ با فضای وضعیت S و احتمال انتقال P_{xy} ، میانگین و گشتاورهای تعداد گامها تا اولین دیدار مجموعه مکانهای C_i با شروع از مکان x بدون دیدار مجموعه مکانهای C_j (یعنی $C_j T_{xC_i}$) برای $x \in S_T = S - \{C_i \cup C_j\}$ و $C_i \cap C_j = \emptyset, C_i, C_j \subset S$ و به ازای $i, j = 1, 2, \dots, m$ و $i \neq j$ ، روابط بازگشتی زیر ثابت می شوند.

$$\begin{aligned} E(C_j T_{xC_i}) &= C_j f_{xC_i} + \sum_{y \in S_T} P_{xy} E(C_j T_{yC_i}) \\ E(C_j T_{xC_i}^r) &= C_j f_{xC_i}^r + \sum_{k=1}^r \binom{r}{k} \sum_{y \in S_T} P_{xy} E(C_j T_{yC_i}^k) \\ E(e^{t C_j T_{xC_i}}) &= e^t C_j P_{xC_i} + e^t \sum_{y \in S_T} P_{xy} E(e^{t C_j T_{yC_i}}) \end{aligned}$$

که در آن $C_j P_{xC_i}$ احتمال انتقال یک گامی با شروع از مکان x به مجموعه مکانهای C_i (البته بدون دیدار C_j) است.

اثبات: برای اثبات روابط فوق ابتدا رابطه بازگشتی اولین دیدار را با توجه به خاصیت مارکوف زنجیر ثابت می کنیم.

$$\begin{aligned} C_j f_{xC_i}^{k+1} &= P(C_j T_{xC_i} = k+1) \\ &= P(X_1 \in S_T, \dots, X_{k+1} \in S_T, X_k \in C_i | X_0 = x) \\ &= P_x(X_1 \in S_T, \dots, X_{k+1} \in S_T, X_k \in C_i) \\ &= \sum_{y \in S_T} P_x(X_1 = y) \\ &\quad P_x(X_1 \in S_T, \dots, X_{k+1} \in S_T, X_k \in C_i | X_1 = y) \\ &= \sum_{y \in S_T} P_x(X_1 = y) \\ &\quad P(X_1 \in S_T, \dots, X_{k+1} \in S_T, X_k \in C_i | X_1 = y) \\ &= \sum_{y \in S_T} P_{xy} C_j f_{yC_i}^k \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_x(T_{C_i} < T_{C_j}) &= E(C_j T_{xC_i}) = C_j m_{xC_i} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} k \times C_j f_{xC_i}^k \\ \text{Var}_x(T_{C_i} < T_{C_j}) &= \\ \text{Var}(C_j T_{xC_i}) &= E(C_j T_{xC_i}^2) - (E(C_j T_{xC_i}))^2 \\ E(C_j T_{xC_i}^r) &= C_j m_{xC_i}^{(r)} = \sum_{k=1}^{\infty} k^r \times C_j f_{xC_i}^k \\ E(e^{t C_j T_{xC_i}}) &= C_j M_{xC_i}(t) = \sum_{k=1}^{\infty} e^{kt} \times C_j f_{xC_i}^k \end{aligned}$$

توجه کنید که $\left. \frac{d}{dt} C_j M_{xC_i}(t) \right|_{t=0} = C_j m_{xC_i}^{(1)} = C_j m_{xC_i}$ همان میانگین تعداد گامها تا رسیدن به مجموعه مکانهای C_i با شروع از مکان x بدون دیدار مجموعه مکانهای C_j است.

در حالت کلی برای زنجیر مارکوف تحویل ناپذیر بازگشتی مثبت (ارگودیک) مجموعه مکانهای C_i و C_j زیر مجموعه های مجزای فضای وضعیت S بوده و مکان x نیز عضو $S_T = S - \{C_i \cup C_j\}$ است.

در اکثر منابع، فرآیندهای تصادفی برای زنجیرهای مارکوف تحویل پذیر به مکانهای گذرا و بازگشتی (زنجیرهای جاذب)، احتمال جذب و میانگین تعداد گامها برای جذب به مجموعه مکانهای بازگشتی با شروع از مکانهای گذرا با روابطی نسبتاً پیچیده محاسبه شده است. همچنین برای زنجیرهای مارکوف ارگودیک تنها احتمال، میانگین و واریانس تعداد گامها برای رسیدن به یک مکان مورد بررسی قرار گرفته است. (به مراجع [۲]، [۳] و [۵] مراجعه کنید). در مرجع [۴] نیز برای حالتی خاص، میانگین تعداد دیدار از مجموعه مکانهای C_j با شروع از مجموعه مکانهای C_i بدون دیدار از مجموعه مکانهای C_i یا به اصطلاح آن تحت تابوی C_i معرفی شده است.

لیکن در هیچیک از آنها به مسائلی از قبیل مسئله ۱ و نیز حالت کلی مورد نظر ما اشاره نشده است. در این مقاله با تعمیم موارد گذشته برای زنجیرهای ارگودیک، به معرفی و محاسبه میانگین و گشتاورهای مختلف تعداد گامها تا رسیدن به مجموعه مکان مورد نظر بدون دیدار مجموعه مکانهای دیگر می پردازیم. در ادامه این مطلب را به سادگی برای زنجیرهای مارکوف تحویل پذیر به مکانهای بازگشتی و گذرا (زنجیرهای جاذب) تعمیم می دهیم. مقاله شامل مثال هایی کاربردی از موارد ذکر شده است که محاسبات آنها به روش تحلیلی با استفاده از دستگاه معادلات بازگشتی و به روش مبتنی بر اعمال ماتریسی با استفاده از نرم افزار Matlab انجام گرفته است. از جمله مثال هایی که ارائه شده می توان به محاسبه گشتاورها در زنجیر گام زدن تصادفی

$$C_j m_{xC_i}^{(r)} = C_j f_{xC_i} + \sum_{k=1}^r \binom{r}{k} \sum_{y \in S_T} P_{xy} C_j m_{yC_i}^{(k)}$$

$$C_j M_{xC_i}(t) = e^t C_j P_{xC_i} + e^t \sum_{y \in S_T} P_{xy} C_j M_{yC_i}(t)$$

اینک به حل مسئله (۱) می پردازیم. ماتریس احتمال انتقال زنجیر چنین است.

$$P = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix} \quad S = \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

برای یافتن میانگین تعداد گامها برای رسیدن به مکان ۳ قبل از دیدار مکان ۴ (بدون دیدار مکان ۴) با شروع از مکان ۲ با فرضهای $x=2$ ، $C_1 = \{3\}$ و $C_2 = \{4\}$ باید مقدار $E_2(T_3 < T_4) = E_2(T_{23}) = m_{23}$ را محاسبه کنیم. با توجه به لم ۱ و فرض $S_T = \{0, 1, 2\}$ ابتدا احتمالات اولین دیدار از مکانها را از دستگاه معادلات زیر به دست می آوریم.

$$\begin{cases} f_{23} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} f_{13} + \frac{1}{3} f_{23} \\ f_{13} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} f_{23} + \frac{1}{4} f_{13} \\ f_{23} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} f_{23} + \frac{1}{3} f_{13} \end{cases}$$

به سادگی پاسخهای $f_{23} = \frac{5}{8}$ ، $f_{13} = \frac{1}{4}$ و $f_{23} = \frac{5}{8}$ حاصل می شوند.

سپس از دستگاه معادلات

$$\begin{cases} m_{23} = f_{23} + P_{22} m_{23} + P_{21} m_{13} \\ \quad + P_{20} m_{03} = \frac{5}{8} + \frac{1}{3} m_{13} + \frac{1}{3} m_{03} \\ m_{13} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} m_{23} + \frac{1}{4} m_{03} \\ m_{03} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} m_{23} + \frac{1}{3} m_{13} \end{cases}$$

مقادیر $m_{23} = \frac{13}{96} = 1/43$ ، $m_{13} = \frac{1}{6} = 1/17$ و $m_{03} = \frac{119}{96} = 1/24$ به دست می آیند. بنابراین میانگین تعداد گامها برای رسیدن به مکان ۳ قبل از دیدار مکان ۴ با شروع از مکان ۲ برابر $m_{23} = \frac{119}{96} = 1/24$ است.

حال برای $x \in S_T$ داریم:

$$\begin{aligned} E(C_j T_{xC_i}) &= \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) C_j f_{xC_i}^{k+1} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} C_j f_{xC_i}^{k+1} + \sum_{k=1}^{\infty} k \sum_{y \in S_T} P_{xy} C_j f_{yC_i}^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} C_j f_{xC_i}^{k+1} + \sum_{y \in S_T} P_{xy} \sum_{k=1}^{\infty} k C_j f_{yC_i}^k \\ &= C_j f_{xC_i} + \sum_{y \in S_T} P_{xy} E(C_j T_{yC_i}) \end{aligned}$$

به همین ترتیب رابطه بازگشتی گشتاور r ام را برای $x \in S_T$ و $r \geq 2$ به دست می آوریم.

$$\begin{aligned} E(C_j T_{xC_i}^r) &= \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)^r C_j f_{xC_i}^{k+1} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{i=0}^r \binom{r}{i} k^i C_j f_{xC_i}^{k+1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} C_j f_{xC_i}^{n+1} + \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{i=1}^r \binom{r}{i} k^i C_j f_{xC_i}^{k+1} \\ &= C_j f_{xC_i} + \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{i=1}^r \binom{r}{i} k^i \sum_{y \in S_T} P_{xy} C_j f_{yC_i}^k \\ &= C_j f_{xC_i} + \sum_{i=1}^r \binom{r}{i} \sum_{y \in S_T} P_{xy} \sum_{k=1}^{\infty} k^i C_j f_{yC_i}^k \\ &= C_j f_{xC_i} + \sum_{i=1}^r \binom{r}{i} \sum_{y \in S_T} P_{xy} E(C_j T_{yC_i}^i) \end{aligned}$$

همچنین رابطه بازگشتی تابع مولد گشتاور به صورت زیر ثابت می شود.

$$\begin{aligned} E(e^{t C_j T_{xC_i}}) &= \sum_{n=0}^{\infty} e^{t(n+1)} C_j f_{xC_i}^{n+1} \\ &= e^t C_j f_{xC_i}^1 + e^t \sum_{n=1}^{\infty} e^{tn} \sum_{y \in S_T} P_{xy} C_j f_{yC_i}^n \\ &= e^t C_j f_{xC_i}^1 + e^t \sum_{y \in S_T} P_{xy} \sum_{n=1}^{\infty} e^{tn} C_j f_{yC_i}^n \\ &= e^t C_j P_{xC_i} + e^t \sum_{y \in S_T} P_{xy} E(e^{t C_j T_{yC_i}}) \end{aligned}$$

البته با توجه به ارگودیک بودن زنجیر جابجایی سریها مجاز و مقادیر بالا موجود هستند. بنابراین اثبات لم کامل است.

ضمناً روابط بازگشتی لم (۱) را به صورت زیر می نویسیم.

$$C_j m_{xC_i} = C_j f_{xC_i} + \sum_{y \in S_T} P_{xy} C_j m_{yC_i}$$

از رابطه دوم لم ۱ گشتاور دوم به صورت

$$C_j m_{xC_i}^{(2)} = C_j f_{xC_i} + 2 \sum_{y \in S_T} P_{xy} C_j m_{yC_i} + \sum_{y \in S_T} P_{xy} C_j m_{yC_i}^{(2)}$$

نوشته شده که منجر به دستگاه معادلات

$$\begin{cases} {}_f m_{\cdot 3}^{(2)} = \frac{5}{8} + 2 \left(\frac{1}{3} {}_f m_{13} + \frac{1}{3} {}_f m_{23} \right) \\ \quad + \left(\frac{1}{3} {}_f m_{13}^{(2)} + \frac{1}{3} {}_f m_{23}^{(2)} \right) \\ {}_f m_{13}^{(2)} = \frac{1}{3} + 2 \left(\frac{1}{3} {}_f m_{\cdot 3} + \frac{1}{3} {}_f m_{23} \right) \\ \quad + \left(\frac{1}{3} {}_f m_{\cdot 3}^{(2)} + \frac{1}{3} {}_f m_{23}^{(2)} \right) \\ {}_f m_{23}^{(2)} = \frac{3}{8} + 2 \left(\frac{1}{3} {}_f m_{\cdot 3} + \frac{1}{3} {}_f m_{13} \right) \\ \quad + \left(\frac{1}{3} {}_f m_{\cdot 3}^{(2)} + \frac{1}{3} {}_f m_{13}^{(2)} \right) \end{cases}$$

می گردد. با حل دستگاه مقدار ${}_f m_{\cdot 3}^{(2)} = \frac{952}{117} = 5/51$ بدست می آید. بنابراین واریانس تعداد گامها برای رسیدن به مکان ۳ قبل از دیدار مکان ۴ با شروع از مکان ۲ برابر است با:

$$Var({}_f T_{23}) = {}_f m_{23}^{(2)} - ({}_f m_{23})^2 = \frac{997}{251} = 3/97$$

همانطور که مشاهده می کنید محاسبه مقادیر بیان شده در لم (۱) با روش تحلیلی حل دستگاه معادلات طولانی است. جهت ارائه روشی مبتنی بر اعمال بر روی ماتریسها و استفاده از محاسبات کامپیوتری بدین طریق عمل می کنیم.

برای زنجیرهای مارکوف ارگودیک با فضای وضعیت متناهی ماتریسها یا بردارهای زیر را تعریف می کنیم.

$$f = (C_j f_{xC_i}), \quad m = (C_j m_{xC_i}) \\ m^{(r)} = (C_j m_{xC_i}^{(r)}), \quad M(t) = (C_j M_{xC_i}(t))$$

حال ماتریس احتمال انتقال $P = (P_{xy})$ را در نظر گرفته و زیرماتریس Q و بردار R را بدین صورت معرفی می کنیم.

ماتریس مربع Q متشکل از احتمالات انتقال از مجموعه مکان S_T به مجموعه مکان S_T است یعنی

$$Q = (P_{xy}) \quad x, y \in S_T$$

بردار ستونی R متشکل از مجموع مولفه های ستونی احتمالات انتقال از مجموعه مکان S_T به مجموعه مکان C_i است یعنی

$$R = \left(\sum_{y \in C_i, y \notin C_j} P_{xy} \right) \quad x \in S_T$$

بدلیل استفاده مکرر از ماتریس زیر و جهت حفظ سادگی روابط مبتنی بر ماتریس که از لم ۱ نتیجه می گیریم ماتریس مربع زیر را معرفی می کنیم. این ماتریس شامل مولفه هایی با مقدار امید تعداد ملاقات از مکانهای S_T بوده که تعمیمی از ماتریس مقدماتی (پتانسیل) است که در مراجع [۲]، [۳] و [۵] تعریف شده اند. ما نیز این ماتریس را ماتریس مقدماتی می گوئیم.

$$G = (E_x(N(y))) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} P_{xy}^n \right) = (I - Q)^{-1} \\ x, y \in S_T$$

که در آن I ماتریس یکه با ابعاد Q بوده و متغیر تصادفی $N(y)$ تعداد دیدار از y است. توجه کنید که چون اندازه مقادیر ویژه ماتریس Q کمتر از یک است لذا معکوس پذیری ماتریس بالا موجه می باشد.

لم (۲) برای زنجیر مارکوف ارگودیک $\{X_n, n \geq 0\}$ با فضای وضعیت متناهی S و ماتریس احتمال انتقال $P = (P_{xy})$ ، احتمال اولین دیدار مجموعه مکانهای C_i ، میانگین و گشتاورهای تعداد گامها تا اولین دیدار مجموعه مکانهای C_i با شروع از مکان x بدون دیدار مجموعه مکانهای C_j (یعنی $C_j T_{xC_i}$) برای $x \in S_T = S - \{C_i \cup C_j\}$ و $C_i \cap C_j = \emptyset, C_i, C_j \subset S$ و به ازای $i, j = 1, 2, \dots, m$ و $i \neq j$ روابط بازگشتی مبتنی بر ماتریس به صورت زیر ثابت می شوند.

$$f = (C_j f_{xC_i}) = GR$$

$$m = m^{(1)} = (C_j m_{xC_i}) = G^T R$$

$$m^{(r)} = (C_j m_{xC_i}^{(r)}) = G^T R + (G - I) \sum_{k=1}^{r-1} \binom{r}{k} m^{(k)}$$

$$r \geq 2 \\ M(t) = (C_j M_{xC_i}(t)) = e^t (I - e^t Q)^{-1} R$$

اثبات : ابتدا رابطه مبتنی بر ماتریس را برای محاسبه احتمال اولین دیدار ثابت می کنیم. به سادگی از رابطه بازگشتی

$$C_j f_{xC_i} = C_j P_{xC_i} + \sum_{y \in S_T} P_{xy} C_j f_{yC_i}$$

رابطه ماتریسی زیر به دست می آید.

$$(I - Q)f = R \Rightarrow f = R + Qf$$

$$\Rightarrow f = (I - Q)^{-1} R = GR$$

با استفاده از روابط لم ۱ ماتریس میانگین تعداد گامها تا اولین دیدار مجموعه مکانهای C_i با شروع از مکان x بدون دیدار مجموعه

مکانهای C_j برابر است با:

$$m = m^{(1)} = GR + Qm \Rightarrow (I - Q)m = GR \\ \Rightarrow m = G^{\vee} R$$

همچنین به ازای $r \geq 2$ از رابطه بازگشتی گشتاور r ام در لم ۱ بدست می آوریم که:

$$m^{(r)} = GR + \sum_{k=1}^{r-1} \binom{r}{k} Qm^{(k)} + Qm^{(r)} \\ (I - Q)m^{(r)} = GR + \sum_{k=1}^{r-1} \binom{r}{k} Qm^{(k)}$$

بنابراین

$$m^{(r)} = G \left[GR + \sum_{k=1}^{r-1} \binom{r}{k} Qm^{(k)} \right] \\ = G^{\vee} R + GQ \sum_{k=1}^{r-1} \binom{r}{k} m^{(k)}$$

و اثبات رابطه با توجه به این که $GQ = G - I$ است کامل می گردد. ضمناً در حالت های خاص داریم:

$$m^{(2)} = (2G - I)G^{\vee} R$$

$$m^{(3)} = (6G^{\vee} - 6G + I)G^{\vee} R$$

برای اثبات رابطه بازگشتی تابع مولد گشتاور از لم ۱ داریم:

$$M(t) = e^t (I - e^t Q)^{-1} R \\ \Rightarrow M(t) = e^t R + e^t Q M(t)$$

بنابراین اثبات لم کامل است.

لم ۳) در صورتی که تنها یک مجموعه C_i داشته باشیم آنگاه احتمال رسیدن به آن حتمی بوده و برای $x \in S_T$ مقدار $f_{xC_i} = 1$ است. پس بردار مربوط به آن برابر $\langle 1 \rangle = GR = f$ می گردد که در آن $\langle 1 \rangle$ بردار ستونی با مولفه های یک است. همچنین در این حالت روابط میانگین و گشتاور r ام برای لم های ۱ و ۲ به صورت زیر در می آیند.

$$E(T_{xC_i}) = 1 + \sum_{y \in S_T} P_{xy} E(T_{yC_i})$$

$$E(T_{xC_i}^r) = 1 + \sum_{k=1}^r \binom{r}{k} \sum_{y \in S_T} P_{xy} E(T_{yC_i}^k)$$

$$m = m^{(1)} = G \langle 1 \rangle$$

$$m^{(r)} = G \langle 1 \rangle + (G - I) \sum_{k=1}^{r-1} \binom{r}{k} m^{(k)} \quad r \geq 2$$

در منابع مختلف فرآیندهای تصادفی برای زنجیره های تحویل پذیر به مکانهای گذرا و بازگشتی (زنجیر جاذب) تنها این موارد خاص برای

محاسبه میانگین و واریانس تعداد گامهای طی شده در مجموعه مکانهای گذرای S_T تا جذب در مجموعه مکانهای بازگشتی C_i بیان شده است. ضمناً در این منابع روابط مبتنی بر ماتریس برای محاسبه گشتاور دوم خیلی پیچیده تر از روابط بالا است [۵].

مثال ۲) مسئله ۱ را با روش ماتریسی حل کنید.

ماتریس احتمال انتقال زیر را در نظر بگیرید.

$$P = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix} \quad S = \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

برای ماتریس احتمال انتقال فوق با فرض $x=2$, $C_1 = \{3\}$, $C_2 = \{4\}$ و $S_T = \{0, 1, 2\}$ ماتریس و بردار

$$Q = \begin{pmatrix} P_{..} & P_{.1} & P_{.2} \\ P_{1.} & P_{11} & P_{12} \\ P_{2.} & P_{21} & P_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix} \quad \text{و}$$

$$R = \begin{pmatrix} P_{.3} \\ P_{.4} \\ P_{.5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{4} \\ 0 \end{pmatrix}$$

بدست می آید. ماتریس مقدماتی برابر است با:

$$G = (I - Q)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{11}{8} & \frac{2}{3} & \frac{5}{8} \\ \frac{1}{2} & \frac{4}{3} & \frac{1}{2} \\ \frac{5}{8} & \frac{2}{3} & \frac{11}{8} \end{pmatrix}$$

با استفاده از روابط لم ۲ به راحتی داریم:

$$m = m^{(1)} = G^{\vee} R = \begin{pmatrix} 4m_{.3} \\ 4m_{13} \\ 4m_{23} \end{pmatrix}$$

$$m^{(2)} = G^{\vee} R + 2(G - I)m^{(1)} = \begin{pmatrix} 5/6 \\ 4/61 \\ 5/51 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} (Var(C_j T_{xC_i})) &= m^{(2)} - (C_j m_{xC_i})^2 \\ &= \begin{pmatrix} 3/56 \\ 3/25 \\ 3/97 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Var({}_4T_{.3}) \\ Var({}_4T_{13}) \\ Var({}_4T_{23}) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

بنابراین میانگین و واریانس تعداد گامهای ذره برای رسیدن به مکان ۳ قبل از دیدار مکان ۴ با شروع از مکان ۲ به ترتیب برابر $4m_{23} = 1/24$ و $Var({}_4T_{23}) = 3/97$ هستند.

$$G = (I - Q)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{11}{9} & \frac{2}{3} & \frac{2}{9} \\ \frac{4}{9} & \frac{4}{3} & \frac{4}{9} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{3} & \frac{10}{9} \end{pmatrix}$$

با استفاده از روابط لم ۲ به سادگی داریم:

$$f = GR = \begin{pmatrix} \frac{11}{9} & \frac{2}{3} & \frac{2}{9} \\ \frac{4}{9} & \frac{4}{3} & \frac{4}{9} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{3} & \frac{10}{9} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{18} \\ \frac{5}{9} \\ \frac{7}{18} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_7 f_1 C_1 \\ C_7 f_2 C_1 \\ C_7 f_5 C_1 \end{pmatrix}$$

$$m = G^T R = \begin{pmatrix} C_7 m_1 C_1 \\ C_7 m_2 C_1 \\ C_7 m_5 C_1 \end{pmatrix}$$

در نتیجه احتمال این که موش به پنیر برسد (به مجموعه مکان $C_1 = \{3, 4\}$ برسد) قبل از این که در تله بیافتد (به مجموعه مکان $C_7 = \{6, 7\}$ برسد) با شروع از مکان ۲ برابر $C_7 f_2 C_1 = \frac{5}{9}$ بوده و میانگین تعداد گامهای آن برابر $C_7 m_2 C_1 = \frac{78}{27} = 1/0.4$ است. توجه کنید که هم احتمال این که موش با شروع از مکان ۲ به پنیر برسد و هم میانگین تعداد گامهای آن بیشتر از مقدار آنها برای حالتی است که موش با شروع از مکانهای ۱ یا ۵ به پنیر برسد.

از طرف دیگر با استفاده از رابطه مربوط به تابع مولد گشتاور لم ۲ داریم:

$$M(t) = e^t (I - e^t Q)^{-1} R = \begin{pmatrix} \frac{\frac{2}{3}e^{2t} + \frac{1}{6}e^{3t}}{4 - e^{2t}} \\ \frac{\frac{4}{3}e^t + \frac{1}{3}e^{2t}}{4 - e^{2t}} \\ \frac{\frac{1}{3}e^{2t} + \frac{1}{6}e^t(6 - e^{2t})}{4 - e^{2t}} \end{pmatrix}$$

پس تابع مولد گشتاور تعداد گامها تا دیدار مجموعه مکان $C_1 = \{3, 4\}$ قبل از دیدار مجموعه مکان $C_7 = \{6, 7\}$ با شروع از مکان ۲ برابر است با:

$$C_7 M_{2C_1}(t) = \frac{\frac{4}{3}e^t + \frac{1}{3}e^{2t}}{4 - e^{2t}}$$


با مشتق گیری از آن بر حسب t و قرار دادن $t = 0$ مجدداً میانگین زیر به دست می آید.

$$C_7 m_{2C_1} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\frac{4}{3}e^t + \frac{1}{3}e^{2t}}{4 - e^{2t}} \right)_{t=0} = \frac{78}{27} = 1/0.4$$

برنامه کامپیوتری Matlab جهت محاسبات بالا چنین است.

```
Q = [0 1/3 1/3; 1/4 0 1/4; 1/3 1/3 0];
R = [1/3; 1/4; 0];
G = inv(eye(size(Q)) - Q);
m1 = (G^2)*R %for rational answer uses rats()
m2 = m1 + 2*(G-eye(size(Q)))*m1;
for i=1:2
    V(i) = m2(i) - m1(i)^2;
end
V
```

مثال ۳) یک موش در حجره های زیر به تصادف حرکت می کند.



اگر در حجره های ۶ و ۷ تله و در حجره های ۳ و ۴ پنیر قرار دهیم میانگین تعداد گامهای موش برای رسیدن به پنیر بدون افتادن در تله ها با شروع از حجره ۲ چقدر است؟

اگر حرکت موش از هر مکان (حجره) به مکان مجاور با احتمال یکسان به تعداد راههای قابل عبور باشد آنگاه ماتریس احتمال انتقال حرکت موش در مکانهای مختلف به صورت زیر است،

$$P = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

با فرض $x = 2$ ، $C_1 = \{3, 4\}$ ، $C_7 = \{6, 7\}$ و $S_T = \{1, 2, 5\}$ ماتریس و بردار

$$Q = \begin{pmatrix} P_{11} & P_{12} & P_{15} \\ P_{21} & P_{22} & P_{25} \\ P_{51} & P_{52} & P_{55} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \quad \text{و}$$

$$R = \begin{pmatrix} P_{13} + P_{14} \\ P_{23} + P_{24} \\ P_{53} + P_{54} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 + 0 \\ \frac{1}{3} + 0 \\ 0 + \frac{1}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

بدست می آید. ماتریس مقدماتی برابر است با:

برنامه کامپیوتری Matlab جهت محاسبات بالا چنین است.

```
clear all;
Q=[0 1/2 0;1/3 0 1/3;0 1/4 0];
G=inv(eye(3)-Q); rats(G)
R=[0;1/3;1/4];
f=G*R; rats(f)
m=G^2*R; rats(m)
syms t
M=exp(t)*inv(eye(3)-exp(t)*Q)*R;
pretty(M)
dM=diff(M);
pretty(simplify(dM))
```

تبدیل می شود که در آن داریم:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\circ) = \begin{pmatrix} \circ & \circ & \circ \\ 0 & \circ & \circ \end{pmatrix}$$

$$R = (R_1, R_2) = \begin{pmatrix} \circ & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \circ \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad Q = \begin{pmatrix} \circ & \frac{1}{2} & \circ \\ \frac{1}{3} & \circ & \frac{1}{3} \\ \circ & \frac{1}{4} & \circ \end{pmatrix}$$

بنابراین در مثال ۳ میانگین تعداد گامها تا جذب در $C_1 = \{3, 4\}$ بدون دیدار $C_2 = \{6, 7\}$ با شروع از مکان ۲ محاسبه شده است. این مطلب را می توان تعمیم داده و گشتاورهای تعداد گامها تا جذب در مجموعه مکانهای بازگشتی C_i بدون دیدار یا قبل از دیدار مجموعه مکانهای بازگشتی C_i, C_j, C_k و C_1 با شروع از مکان گذرای $x \in S_T$ محاسبه نمود. در این حالت نیز روابط لم های ۱ و ۲ به قوت خود باقی هستند فقط به جای R از R_i استفاده می کنیم.

در حالت کلی ماتریس انتقال زنجیر مارکف تحویل پذیر به مکانهای گذرا و بازگشتی (زنجیر جاذب) به یکی از صورتهای ماتریس بلوکی زیر نشان داده می شود.

$$P = (P_{xy}) = \begin{pmatrix} I & (\circ) \\ R & Q \end{pmatrix} \quad \text{یا} \quad P = \begin{pmatrix} Q & R \\ (\circ) & I \end{pmatrix} \quad x, y \in S$$

که در آن $(\circ)$ ماتریس صفر، I ماتریس یکه حاصل از انتقالهای C_i به C_i با فرض $P_{C_i C_i} = 1$ ($i = 1, 2, \dots, m$) و سایر مولفه های سطری C_i برابر صفر، ماتریس یا بردار R متشکل از مجموع احتمالات انتقال مولفه های ستونی هر مجموعه مکانهای بازگشتی $C_1, C_2, \dots, C_m$ با شروع از مکانهای گذرا به صورت $R = (R_1 \ R_2 \ \dots \ R_m)$ و زیر ماتریس Q متشکل از احتمالات انتقال از مکانهای گذرا به گذرا هستند. فضای وضعیت زنجیر را با S نشان داده که به مجموعه مکانهای گذرا S_T و مجموعه مکانهای بازگشتی C_i برای $i = 1, \dots, m$ تفکیک شده است. (مرجع (۱) را ببینید.)

مثال ۴ در زنجیر ورشکستگی بازیکن برای $d = 3$ با ماتریس انتقال زیر میانگین و تابع مولد گشتاور تعداد گامها تا جذب در هر کدام از مکانهای بازگشتی با شروع از مکانهای گذرا را بیابید.

۳. گشتاورها در زنجیر جاذب

در برخی از منابع فرآیندهای تصادفی زنجیر مارکوف تحویل پذیر به مکانهای گذرا و بازگشتی را زنجیر جاذب می گویند. (به مراجع ۱ و ۵ مراجعه کنید.) تعمیم لم های ۱ و ۲ برای زنجیرجاذب به سادگی با یک تبدیل انجام می گیرد. با فرض این که مجموعه مکانهای S_T برای وضعیتهای گذرا و مجموعه مکانهای C_i ($i = 1, 2, \dots, m$) برای مجموعه وضعیتهای بازگشتی در نظر گرفته شوند، میانگین و گشتاورهای مختلف تعداد گامها تا جذب به مجموعه مکانهای C_i بدون دیدار از مجموعه مکانهای C_j ها برای $i \neq j$ با استفاده از روابط لم های ۱ و ۲ قابل محاسبه هستند.

برای تبدیل ماتریس انتقال زنجیر ارگودیک به ماتریس انتقال زنجیره جاذب بدین طریق عمل می کنیم. ابتدا مجموعه مکانهای C_i را جاذب می کنیم یعنی برای هر مجموعه مکانهای C_i یک سطر در نظر گرفته که در آن $P_{C_i C_i} = 1$ ($i = 1, 2, \dots, m$) و سایر مولفه های سطر مربوط به C_i برابر صفر باشد. سپس مجموع مولفه های هر ستون مربوط به احتمال انتقال مکانهای گذرا به مجموعه مکانهای C_i را محاسبه و در محل آن قرار می دهیم. در انتها مولفه های مربوط به احتمالات انتقال از مکانهای گذرا به مکانهای گذرا را بدون هیچ تغییری می نویسیم.

مثلا ماتریس احتمال انتقال مثال ۳ با جابجایی سطرها و ستونها و با فرض $C_1 = \{3, 4\}$ ، $C_2 = \{6, 7\}$ و $S_T = \{1, 2, 5\}$ به یک ماتریس انتقال زنجیر جاذب به صورت

$$P = \begin{matrix} C_1 = \{3, 4\} \\ C_2 = \{6, 7\} \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & \circ & \circ & \circ & \circ \\ \circ & 1 & \circ & \circ & \circ \\ \circ + \circ & \frac{1}{2} + \circ & \circ & \frac{1}{2} & \circ \\ \frac{1}{3} + \circ & \circ + \circ & \frac{1}{3} & \circ & \frac{1}{3} \\ \circ + \frac{1}{4} & \frac{1}{4} + \frac{1}{4} & \circ & \frac{1}{4} & \circ \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I & (\circ) \\ R & Q \end{pmatrix}$$

```

m1=(N^2)*R;
fprintf ' The Mean m1= \n; pretty(simplify(m1))
m2=m1+(N-eye(size(Q)))*2*m1;
for i=1:2
    for j=1:2
        V(i,j)=m2(i,j)-m1(i,j)^2;
    end
end
fprintf ' The Variance V= \n; pretty(simplify(V))
M=exp(t)*inv(eye(size(Q))-exp(t)*Q)*R;
fprintf ' M(t)= \n; pretty(simplify(M))
dM=diff(M);
fprintf ' dM(t)/dt= \n; pretty(simplify(dM))
fprintf '
***** \n;

```

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1-p & 0 & p & 0 \\ 0 & 1-p & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad S = \{0, 1, 2, 3\}$$

به سادگی معلوم می شود که مکانهای $C_1 = \{0\}$ و $C_2 = \{3\}$ بازگشتی و مکانهای $S_T = \{1, 2\}$ گذرا هستند. همچنین

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & p \\ 1-p & 0 \end{pmatrix}, \quad R = (R_1 \quad R_2) = \begin{pmatrix} 1-p & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}$$

بنابراین ماتریس مقدماتی برابر است با

$$G = (I - Q)^{-1} = \frac{1}{1-p+p^2} \begin{pmatrix} 1 & p \\ 1-p & 1 \end{pmatrix}$$

مثال ۵) زنجیر ورشکستگی بازیکن با فضای وضعیت $S = \{0, 1, \dots, d\}$ و تابع احتمال انتقال زیر را در نظر بگیرید.

$$P_{xy} = \begin{cases} p & y = x+1 \\ q & y = x-1 \end{cases} \quad x, y = 1, 2, \dots, d-1$$

$$P_{.,} = P_{dd} = 1 \quad (p, q > 0, p+q=1)$$

میانگین تعداد دور بازی تا ورشکستگی بازیکن چقدر است؟
در رابطه میانگین لم ۱ مقادیر $C_1 = \{0\}$ و $C_2 = \{d\}$ و $S_T = \{1, 2, \dots, d-1\}$ را قرار داده به دستگاه معادلات زیر می رسیم.

$$\begin{cases} d m_{x.} = d f_{x.} + \sum_{y=1}^{d-1} P_{xy} d m_{y.} \\ = d f_{x.} + p d m_{x+1.} + q d m_{x-1.}, \quad 1 \leq x \leq d-1 \\ d m_{.} = 0, \quad d m_d = 0 \end{cases}$$

که در آن احتمال های جذب برای $x \in S_T$ برابرند با:

$$f_{x.} = \frac{\left(\frac{q}{p}\right)^x - \left(\frac{q}{p}\right)^d}{1 - \left(\frac{q}{p}\right)^d} \quad p \neq q$$

$$f_{x.} = 1 - \frac{x}{d} \quad p = q$$

در حالت متقارن $p = q = \frac{1}{2}$ دستگاه معادلات فوق با فرض $m_x = d m_{x.}$ به شکل دستگاه معادلات زیر در می آید.

$$\begin{cases} m_{x+1} - 2m_x + m_{x-1} = 2\left(1 - \frac{x}{d}\right) \quad 1 \leq x \leq d-1 \\ m_{.} = 0, \quad m_d = 0 \end{cases}$$

ماتریس میانگینها و ماتریس تابع مولد گشتاورهای تعداد گامها تا جذب در C_i بدون دیدار C_j به ترتیب برابرند با

$$m = \begin{pmatrix} m_{1.} & m_{12} \\ m_{2.} & m_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E(T_1) & E(T_{12}) \\ E(T_2) & E(T_{22}) \end{pmatrix} =$$

$$G^2 R = \frac{1}{(1-p+p^2)^2} \begin{pmatrix} (1+p-p^2)(1-p) & 2p^2 \\ 2(1-p)^2 & (1+p-p^2)p \end{pmatrix}$$

$$M(t) = e^t (I - e^t Q)^{-1} R$$

$$= \frac{1}{1-pe^{2t}+p^2e^{4t}} \begin{pmatrix} (-1+p)e^t & p^2e^{2t} \\ (-1+p)^2e^{2t} & pe^t \end{pmatrix}$$

مثلا به ازای $p = \frac{1}{4}$ ماتریسهای زیر حاصل می شوند.

$$M(t) = \frac{1}{4-e^{2t}} \begin{pmatrix} 2e^t & e^{2t} \\ e^{2t} & 2e^t \end{pmatrix}$$

$$m = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 10 & 8 \\ 8 & 10 \end{pmatrix}$$

برنامه کامپیوتری Matlab جهت محاسبات گشتاورهای مختلف مثال ۴ چنین است.

```

syms t p
P = [1 0 0 0; 1-p 0 p 0; 0 1-p 0 p; 0 0 0 1];
Q = [0 p; 1-p 0]; R = [1-p 0; 0 p];
N = inv(eye(size(Q))-Q)

```

است (مرجع (۵) را ببینید.) برای زنجیر ورشکستگی بازیکن میانگین تعداد گامها برای جذب به مکانهای $\circ$ یا d در حالت $p = q$ برابر است با

$$m_{x,\{.,d\}} = x(d-x)$$

در نتیجه به راحتی می توان میانگین تعداد گامها تا جذب به d را از اختلاف $m_{x,\{.,d\}} - d m_{x,\circ}$ به دست آورد. به عبارت دیگر میانگین تعداد گامها تا جذب به تفکیک مجموعه مکانهای جاذب تعمیم یافته است.

ضمنا تابع مولد گشتاور تعداد گامها تا جذب به مکان $\circ$ برای زنجیر ورشکستگی بازیکن در معادلات زیر صدق می کند.

$$\begin{cases} {}_d M_{x,\circ} = e^t {}_d P_{x,\circ} + \\ e^t (p {}_d M_{x+1,\circ} + q {}_d M_{x-1,\circ}) \quad 1 \leq x \leq d-1 \\ {}_d M_{\circ,\circ} = e^t, \quad {}_d M_{d,\circ} = \circ \end{cases}$$

برای حل دستگاه با جمع بندی روی مقادیر x و شرط $m_{\circ} = \circ$ رابطه

$$\sum_{y=1}^x (m_{y+1} - 2m_y + m_{y-1}) = 2(x - \frac{x(x+1)}{2d})$$

$$m_{x+1} - m_x = m_1 + 2x - \frac{x(x+1)}{d}$$

به دست آمده که با جمع بندی مجدد روی مقادیر x به دست می آوریم:

$$\sum_{y=1}^{x-1} (m_{y+1} - m_y) = m_x - m_1 = \sum_{y=1}^{x-1} (m_1 + 2y - \frac{y(y+1)}{d})$$

با کمی عملیات جبری و قرار دادن مقدار $x = d$ و شرط $m_d = \circ$ پاسخ دستگاه به صورت زیر به دست می آید. به عبارت دیگر میانگین تعداد دور بازی تا ورشکستگی بازیکن در حالت $p = q = \frac{1}{2}$ برابر است با

$$m_{x=d} m_{x,\circ} = \frac{1}{2d} x(d-x)(2d-x) \quad x \in S$$

در حالت $p \neq q$ پاسخ دستگاه با فرض $\lambda = \frac{q}{p}$ برابر است با:

$$m_{x=d} m_{x,\circ} = \frac{x(\lambda^x + \lambda^d)(1 - \lambda^d) - 2d \lambda^d (1 - \lambda^x)}{p(1 - \lambda^d)(1 - \lambda)}$$

ضمنا برای حد $d \rightarrow \infty$ در حالت $p < q$ مقدار

$${}_d m_{x,\circ} = \frac{x}{q-p} \text{ می گردد.}$$

همانطوری که در بسیاری از کتابهای فرآیندهای تصادفی ثابت شده

مراجع

- [۱] میرخان، سید محمود ، ۱۳۸۱، کنکاش بیشتر در زنجیره های مارکوف ، ششمین کنفرانس آمار در دانشگاه تربیت مدرس
- [2] Erhan Cinlar., 1975, *Introduction to Stochastic Processes*, Prentice-Hall, Inc.
- [3] Roe Goodman, 1988, *Introduction to Stochastic Models*, The Benjamin/Cumming Publishing Company, Inc.
- [4] Latouche, G. and Ramaswami. V., 1999, *Introduction to Matrix analytic methods in Stochastic Modeling*, American Statistical Association
- [5] Bhat B. R., 2000, *Stochastic Models Analysis and Applications*, New Age International Publishers.