

نتایجی در زمینه توزیع‌های تعادلی و کاربرد آن در مطالعه سیستم‌های متوالی

پرستو میری^۱، مهدی توانگر^۲

چکیده:

توزیع‌های تعادلی کاربرد زیادی در نظریه قابلیت اعتماد، ترتیب‌های تصادفی و فرآیندهای تصادفی دارند. در واقع منشأ اصلی پیدایش این مفهوم نظریه تجدید است. در این مقاله مفهوم توزیع تعادلی را معرفی و خواص مهم آن را بیان می‌کنیم. همچنین برخی نتایج مرتبط با این موضوع را برای طول عمر سیستم متوالی ارائه می‌کنیم. در مقاله حاضر مشخص سازی توزیع تعمیم یافته پارتو نیز مورد بررسی قرار گرفته و به برخی روابط بین توزیع‌های تعادلی و پایه اشاره شده است.

واژه‌های کلیدی: مفاهیم سالخوردگی، قابلیت اعتماد، نرخ شکست، میانگین عمر باقیمانده، مشخص سازی، ترتیب‌های تصادفی.

۱ مقدمه

مؤلفه فعال در زمان t باشد. توزیع مجانبی U_t و V_t را توزیع

تعادلی^۴ متناظر با $F(x)$ می‌نامند که دارای تابع چگالی زیر است:

(کاکس^۵، ۱۹۶۲)

$$g(x) = \mu^{-1} \bar{F}(x), \quad x > 0, \quad (1)$$

که در آن $\bar{F}(x) = 1 - F(x)$ تابع قابلیت اعتماد است. معمولاً $F(x)$ را توزیع پایه می‌نامند. منشأ اصلی پیدایش این مفهوم نظریه تجدید است که در آن توزیع تعادلی در واقع توزیع مجانبی زمان‌های بازگشت پیشرو و پسرو است. مطالعات گسترده‌ای روی ویژگی‌های قابلیت اعتماد این توزیع مانند رفتار نرخ شکست، میانگین عمر باقیمانده و ... انجام شده است. همچنین تلاش‌هایی در جهت یافتن روابط بین توزیع تعادلی و توزیع پایه از نظر ویژگی‌های مختلف قابلیت اعتماد انجام شده است. کاربردهای متعددی نیز از توزیع‌های تعادلی در مشخص سازی توزیع‌های احتمال، تعریف مفاهیم جدید سالخوردگی، ترتیب‌های تصادفی و

متغیرهای تصادفی مستقل و هم توزیع $X_1, X_2, \dots$ را با تابع توزیع

مشترک $F(x)$ و میانگین متناهی μ در نظر بگیرید. فرض کنید

این متغیرهای تصادفی طول عمر اجزاء (قطعات) یک سیستم باشند به طوری که با از بین رفتن قطعه اول، قطعه دوم جایگزین می‌شود، پس از خرابی قطعه دوم، این قطعه با قطعه سوم تعویض می‌شود و الی آخر. برای $n = 1, 2, \dots$ تعریف می‌کنیم $Y_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$. در این صورت $\{Y_n\}$ یک فرآیند تجدید^۳ را تشکیل می‌دهد. تحت این شرایط، مطالعه ویژگی‌های سالخوردگی سیستم یا مؤلفه‌ی فعال در زمان t حائز اهمیت است. امروزه کاربرد گسترده فرآیند تجدید را می‌توان در بسیاری از تجهیزات و دستگاه‌های مورد استفاده بشر ملاحظه کرد.

فرض کنید U_t و V_t به ترتیب نشان دهنده سن و عمر باقیمانده

^۱ دانشجوی کارشناسی ارشد آمار دانشگاه اصفهان

^۲ استادیار گروه آمار دانشگاه اصفهان

^۳ process renewal

^۴ distribution equilibrium

^۵ Cox

^۶ Gupta

^۷ Deshpande

^۸ Preeth & Nair

^۹ Kirmani & Gupta

^{۱۰} Shaked

^{۱۱} Shanthikumar

فرآیندهای تصادفی ارائه شده است که برای جزئیات بیشتر می‌توان به گوپتا^۶ (۱۹۷۹)، دشیاندا^۷ و همکاران (۱۹۸۶)، نایر و پریس^۸ (۲۰۰۹)، گوپتا و کرمانی^۹ (۱۹۹۰) و شیکد^{۱۰} و شانتیکومار^{۱۱} (۲۰۰۷) مراجعه کرد.

توزیع تعادلی در رابطه (۱) را توزیع تعادلی مرتبه اول می‌نامند. به عنوان تعمیمی از این توزیع، فاگیولی و پلری^{۱۲} (۱۹۹۳) مفهوم توزیع تعادلی مرتبه n را به ازای $n = 1, 2, \dots$ به صورت زیر تعریف کرده‌اند. فرض کنید X یک متغیر تصادفی نامنفی با تابع توزیع مطلقاً پیوسته $F(x)$ و تابع چگالی احتمال $f(x)$ با شرط $E(X^n) < \infty$ باشد. تابع قابلیت اعتماد توزیع تعادلی مرتبه n بر اساس رابطه بازگشتی زیر تعریف می‌شود:

$$S^{(n)}(x) = \frac{1}{\mu^{(n-1)}} \int_x^\infty S^{(n-1)}(u) du, \quad (2)$$

که در آن

$$\mu^{(n)} = \int_0^\infty S^{(n)}(u) du, \quad (3)$$

$$S^{(0)}(x) = \frac{f(x)}{f(0)}.$$

در مقاله حاضر مفهوم توزیع‌های تعادلی را معرفی کرده و خواص مهم آن را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. در بخش ۲، نتایجی مرتبط با توزیع تعادلی طول عمر سیستم‌های متوالی ارائه شده است. بخش ۳ به مشخص سازی توزیع تعمیم یافته پارتو بر مبنای توزیع‌های تعادلی اختصاص یافته است. در بخش ۴ توزیع‌های تعادلی از نقطه نظر مفاهیم سالخورده‌گی و ترتیب‌های تصادفی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش ۵ نیز توزیع‌های تعادلی گسسته معرفی شده‌اند.

پاکس و ناوارو^{۱۳} (۲۰۰۷) نشان داده‌اند که $S^{(0)}(x)$ یک تابع قابلیت اعتماد است اگر و فقط اگر $f(x)$ پیوسته و نزولی باشد. لازم به ذکر است که $S^{(1)}(x) = \bar{F}(x)$ تابع قابلیت اعتماد X و $S^{(2)}(x)$ تابع قابلیت اعتماد توزیع تعادلی مرتبه اول است.

از جمله کاربردهای توزیع‌های تعادلی در نظریه قابلیت اعتماد می‌توان به ترتیب‌بندی‌های جزئی و مفاهیم سالخورده‌گی اشاره کرد که توسط فاگیولی و پلری (۱۹۹۳) ارائه شده است. همچنین ناندا^{۱۴} و همکاران (۱۹۹۶) ویژگی‌های گشتاوری توزیع تعادلی مرتبه n را مورد مطالعه قرار داده‌اند. گوپتا (۲۰۰۷) روابط میان توزیع تعادلی و توزیع پایه را بررسی کرده است. به علاوه نتایج مشابهی مرتبط با توزیع تعادلی مرتبه n و توزیع پایه توسط نایر و پریس (۲۰۰۹) ارائه شده است. آن‌ها همچنین ویژگی‌های مختلف قابلیت اعتماد را برای $S^{(n)}(x)$ و $\bar{F}(x)$ بررسی کرده‌اند که باعث ساده‌تر شدن مقایسه بین توزیع‌ها شده است.

۲ توزیع تعادلی طول عمر سیستم متوالی

فرض کنید X یک متغیر تصادفی با تابع قابلیت اعتماد $\bar{F}(x)$ و تابع چگالی $f(x)$ باشد. می‌توان نشان داد که رابطه زیر بین $S^{(n)}(x)$ و $\bar{F}(x)$ برقرار است:

$$S^{(n)}(x) = \frac{r^{(n-1)}(x)}{r^{(n-1)}(0)} \bar{F}(x), \quad (4)$$

که در آن $r^{(n)}(x) = E[(X-x)^n | X > x]$ n -امین گشتاور عمر باقیمانده X است (نایر و پریس، ۲۰۰۹).

لازم به ذکر است که تابع نرخ شکست و تابع میانگین عمر

^{۱۲}Pellery & Fagioli

^{۱۳}Navarro & Pakes

^{۱۴}Nanda

^{۱۵}Willmot

اثبات. با به کار بردن رابطه (۶) برای اولین آماره ترتیبی داریم:

$$h_{1:m}^{(1)}(x) = \frac{1 + \frac{d}{dx} m_{1:m}^{(1)}(x)}{m_{1:m}^{(1)}(x)}.$$

حال با استفاده از رابطه (۵) می توان نوشت:

$$h_{1:m}^{(1)}(x) = -\frac{d}{dx} h_{1:m}^{(2)}(x) \cdot \frac{1}{h_{1:m}^{(2)}(x)} + h_{1:m}^{(2)}(x)$$

و با توجه به اینکه $mh(x) = h_{1:m}(x)$ نتیجه مورد نظر اثبات می شود.

□

۳ مشخص سازی

مشخص سازی^{۱۶} یکی از جذاب ترین مباحث نظری آمار و احتمالات است که در چند دهه اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. هدف از طرح یک مسأله مشخص سازی آن است که با استفاده از خواص و ویژگی های منحصر بفرد هر توزیع، آن را به طور کامل معین کنیم.

مشخص سازی از جنبه های عملی نیز حائز اهمیت است. یکی از مهم ترین کاربردهای مشخص سازی، گسترش آزمون های نیکویی برازش است. به طور مثال استقلال فاصله های^{۱۷} آماره های ترتیبی بر اساس نمونه تصادفی از یک توزیع پیوسته، توزیع نمایی را نتیجه می دهد. لذا می توان از آن برای ساختن یک آزمون نیکویی برازش سود جست. در متون آماری آزمون های نیکویی برازش بسیاری از این قبیل برای توزیع های مختلف بر اساس نتایج مشخص سازی پیشنهاد شده اند. چند مرجع اساسی در زمینه مشخص سازی وجود دارند که از آن جمله می توان به کاگان^{۱۸} و همکاران (۱۹۷۳) و گالامبوس^{۱۹} و کوتز^{۲۰} (۱۹۷۸) اشاره کرد.

یکی از خانواده توزیع های مهم و کاربردی در نظریه توزیع ها، توزیع تعمیم یافته پارتو^{۲۱} (GPD) با تابع قابلیت اعتماد زیر است:

^{۱۶}characterization

^{۱۷}spacings

^{۱۸}Kagan

^{۱۹}Galambos

^{۲۰}Kotz

^{۲۱} Generalized Pareto distributions

^{۲۲}Johnson

باقیمانده متناظر با $S^{(n)}(x)$ به ترتیب عبارت از

$$h^{(n)}(x) = -\frac{d}{dx} \log S^{(n)}(x),$$

و

$$m^{(n)}(x) = \frac{\int_x^\infty S^{(n)}(u) du}{S^{(n)}(x)},$$

است. بنابراین برای هر $n = 2, 3, 4, \dots$ داریم

$$h^{(n)}(x) = [m^{(n-1)}(x)]^{-1}. \quad (۵)$$

رابطه کلی بین $h^{(n)}(x)$ و $m^{(n)}(x)$ به صورت زیر است:

$$h^{(n)}(x) = \frac{1 + \frac{d}{dx} m^{(n)}(x)}{m^{(n)}(x)}. \quad (۶)$$

ساده ترین نوع ساختار سیستم ها در مهندسی قابلیت اعتماد، سیستم متوالی است که به سیستمی اطلاق می شود که فعال بودن آن مستلزم فعال بودن تمام اجزای آن باشد. بسیاری از مدارهای الکتریکی دارای چنین ساختاری می باشند. یک سیستم متوالی با m جزء مستقل و یکسان را در نظر بگیرید. اگر $X_m, \dots, X_2, X_1$ طول عمر اجزای سیستم با تابع توزیع مشترک $F(x)$ باشند، آن گاه طول عمر سیستم برابر است با اولین آماره ترتیبی؛ یعنی $X_{1:m} = \min(X_1, X_2, \dots, X_m)$.

برای آشنایی با ویژگی های سالخورده گی سیستم های مهندسی می توان به اسدی (۱۳۹۲) مراجعه کرد.

در ادامه برخی از ویژگی های توزیع تعادلی $X_{1:m}$ با تابع قابلیت اعتماد $\bar{F}_{1:m}(x)$ را مورد مطالعه قرار می دهیم. با توجه به این که $\bar{F}_{1:m}(x) = [\bar{F}(x)]^m$ تابع قابلیت اعتماد متناظر با توزیع تعادلی $X_{1:m}$ به صورت زیر است:

$$S_{1:m}^{(2)}(x) = \frac{\int_x^\infty \bar{F}^m(u) du}{E[X_{1:m}]}.$$

قضیه ۱.۲. رابطه بین تابع نرخ شکست توزیع تعادلی مرتبه دوم

$X_{1:m}$ و تابع نرخ شکست $h(x)$ به صورت زیر است:

$$mh(x) = -\frac{d}{dx} \log h_{1:m}^{(2)}(x) + h_{1:m}^{(2)}(x). \quad (۷)$$

(جانسون ۲۲ و همکاران، ۱۹۹۴)

و

$$b' = \frac{b}{m(a+1)-a}.$$

$$\bar{F}(x) = \left(1 + \frac{a}{b}x\right)^{-(1+\frac{1}{a})}, x > 0, \quad (۸)$$

قضیه ۳.۳. متغیر تصادفی نامنفی X دارای توزیع GPD است اگر و فقط اگر

$$S_{1:m}^{(n)} = (1+cx)^{n-1} \bar{F}^m(x), \quad (۹)$$

که در آن c مقدار ثابتی است.

اثبات. ابتدا فرض کنید X دارای توزیع GPD باشد. با به کار بردن معادله (۲) داریم:

$$S_{1:m}^{(n)}(x) = \frac{n!(-\frac{b}{a})^{n-1}(1+\frac{a}{b}x)^{n-1-m-\frac{m}{a}}}{\mu_{(n)}^*[1-(1+\frac{1}{a})m] \dots [n-1-(1+\frac{1}{a})m]}$$

که در آن

$$\mu_{(n)}^* = n! \mu_1^* \mu_2^* \dots \mu_{n-1}^*$$

و

$$\mu_i^* = E[X_{1:m}^{(i)}].$$

حال با انجام کمی محاسبات جبری خواهیم داشت:

$$S_{1:m}^{(n)}(x) = \left(1 + \frac{a}{b}x\right)^{n-1} \bar{F}^m(x).$$

برای اثبات عکس قضیه، فرض کنید (۹) برقرار باشد. در این

صورت

$$\frac{S_{1:m}^{(n)}}{S_{1:m}^{(n-1)}(x)} = (1+cx),$$

و با استفاده از معادله (۲) خواهیم داشت

$$\int_x^\infty S_{1:m}^{(n-1)}(x) = (1+cx)\mu_{n-1}S_{1:m}^{(n-1)}(x).$$

با مشتق‌گیری از دو طرف این معادله نسبت به x داریم:

$$\frac{\frac{d}{dx} S_{1:m}^{(n-1)}(x)}{S_{1:m}^{(n-1)}(x)} = \frac{-(c\mu_{n-1}+1)}{\mu_{n-1}(cx+1)}.$$

حال با گرفتن لگاریتم از دو طرف معادله اخیر خواهیم داشت

$$S_{1:m}^{(n-1)}(x) = K(1+cx)^{-1-\frac{1}{c\mu_{n-1}}}.$$

اگر $x \rightarrow 0$ آنگاه $K=1$. اکنون با جایگذاری $n=2$ داریم

$$S_{1:m}(x) = (1+cx)^{-1-\frac{1}{c}}.$$

لذا نتیجه مورد نظر حاصل می‌شود. $\square$

که در آن $a > -1$ و $b > 0$. این خانواده از توزیع‌ها شامل توزیع نمایی (وقتی $a \rightarrow 0$) با نرخ شکست ثابت، توزیع پارتو (وقتی $a > 0$) با نرخ شکست صعودی و توزیع بتا (وقتی $-1 < a < 0$) با نرخ شکست نزولی است. لذا توزیع GPD مدلی انعطاف‌پذیر برای برازش به انواع مختلفی از داده‌هاست. این توزیع به نحو مطلوبی در بسیاری از مسائل آماری مرتبط با حوزه‌های مالی، بیمه، آب‌شناسی و سایر رشته‌ها به کار می‌رود. توزیع GPD ویژگی‌های جالب بسیاری دارد که از آن جمله می‌توان به خطی بودن میانگین عمر باقیمانده آن اشاره کرد. رابطه بین تابع قابلیت اعتماد، تابع نرخ شکست و تابع میانگین عمر باقیمانده توزیع GPD و توزیع تعادلی مرتبه n آن توسط نایر و پریس (۲۰۰۹) ارائه شده است.

قضیه ۱.۳. فرض کنید X یک متغیر تصادفی نامنفی با تابع قابلیت اعتماد مطلقاً پیوسته $\bar{F}(x)$ باشد و $E(X^n) < \infty$. در این صورت X دارای توزیع GPD است اگر و تنها اگر یکی از ویژگی‌های زیر برای هر $x > 0$ و دو مقدار متوالی $n=i, i+1$ برقرار باشد:

(الف) برای یک c ثابت،

$$S^{(n)}(x) = (1+cx)^{n-1} \bar{F}(x).$$

$$m^{(n)}(x) = C_n m^{(1)}(x) \quad (\text{ب})$$

$$h^{(n)}(x) = K_n h^{(1)}(x) \quad (\text{ج})$$

$$r^{(n)}(x) = A_n [r^{(1)}(x)]^n \quad (\text{د})$$

که در آن $r^{(n)}(x) = E[(X-x)^n | X > x]$ و C_n, K_n و A_n مقادیر ثابت و مثبت هستند.

برای اثبات، می‌توان به نایر و پریس (۲۰۰۹) مراجعه کرد. در ادامه به بررسی رابطه توزیع تعادلی اولین آماره ترتیبی و توزیع پایه از خانواده GPD می‌پردازیم.

نتیجه ۲.۳. اگر X دارای توزیع GPD با تابع قابلیت اعتماد (۸) باشد، آنگاه $X_{1:m}$ نیز دارای توزیع GPD با پارامترهای $a' > -1$ و $b' > 0$ است به طوری که

$$a' = \frac{a}{m(a+1)-a}$$

قضیه ۴.۳. اگر X دارای توزیع GPD باشد، آنگاه

$$m_{1:m}^{(n)}(x) = C_{n,m} m_{1:m}^{(1)}(x) \quad (\text{الف})$$

$$h_{1:m}^{(n)}(x) = K_{n,m} m_{1:m}^{(1)}(x) \quad (\text{ب})$$

$$r_{1:m}^{(n)}(x) = A_{n,m} r_{1:m}^{(1)}(x) \quad (\text{ج})$$

که در آن

$$r_{1:m}^{(n)} = E[(X_{1:m} - x)^n | X > x],$$

و مقادیر ثابت $A_{n,m}$ ، $K_{n,m}$ و $C_{n,m}$ در اثبات آمده اند.

اثبات. برای اثبات قسمت (الف) توجه کنید که با استفاده از

رابطه

$$m_{1:m}^{(n)}(x) = C_{n,m} \frac{\int_x^\infty S_{1:m}^{(n)}(t) dt}{S_{1:m}^{(n)}(x)}$$

می توان نوشت:

$$m_{1:m}^{(n)}(x) = C_{n,m} m_{1:m}^{(1)}(x),$$

که در آن

$$C_{n,m} = \frac{[-(1 + \frac{1}{a})m + 1]}{[-(1 + \frac{1}{a})m + n]}.$$

قسمت (ب) نیز با استفاده از رابطه (۵) واضح است. برای اثبات

قسمت (ج) می توان نوشت:

$$\begin{aligned} r_{1:m}^{(n)}(x) &= E[(X_{1:m} - x)^n | X_{1:m} > x] \\ &= m(1 + \frac{1}{a})(\frac{a}{b}) \\ &\times \frac{\int_x^\infty (t - x)^n (1 + \frac{a}{b}t)^{-(1 + \frac{1}{a})m - 1} dt}{(\bar{F}(x))^m} \\ &= m(1 + \frac{1}{a})(\frac{a}{b})(1 + \frac{a}{b}x)^{-m(1 + \frac{1}{a})} \\ &\times \int_0^\infty y^n (1 + \frac{a}{b}(x + y))^{-m(1 + \frac{1}{a}) - 1} dy \\ &= m(1 + \frac{1}{a})(\frac{b}{a})^n \\ &\times (1 + \frac{a}{b}x)^n \beta(n + 1, m(1 + \frac{1}{a}) - n). \end{aligned}$$

به این ترتیب از آنجایی که

$$r_{1:m}(x) = \frac{b}{a} \cdot \frac{1}{m(1 + \frac{1}{a})} (1 + \frac{a}{b}x),$$

اثبات کامل می شود. $\square$

نتیجه ۵.۳. در توزیع نمایی $m_{1:m}^{(n)}(x)$ با $m_{1:m}^{(1)}(x)$ برابر است.

نتیجه ۶.۳. نرخ شکست (میانگین عمر باقیمانده) توزیع تعادلی مرتبه n برای اولین آماره ترتیبی در توزیع پارتو بر حسب n نزولی (صعودی) و در مدل بتا بر حسب n صعودی (نزولی) است.

۴ ویژگی های سالخورده گی و ترتیب بندی توزیع های تعادلی

طول عمر (زمان شکست) اجزاء یا سیستم های مهندسی در بسیاری از حوزه ها مانند قابلیت اعتماد، مطالعه کیفیت محصولات یک کارخانه و ... مورد بررسی قرار می گیرند. در مبحث مدل بندی تصادفی، این طول عمرها را با متغیرهای تصادفی و خواص احتمالاتی آنها را با توزیع های آماری بیان می کنند. خواص مختلف داده های طول عمر را می توان بر اساس مفاهیم سالخورده گی توصیف کرد. در متون قابلیت اعتماد، معمولاً سالخورده گی را نرخ از کار افتادگی در طول زمان در نظر می گیرند. از جمله مهمترین مفاهیم سالخورده گی می توان به تابع نرخ شکست و تابع میانگین باقیمانده عمر اشاره کرد. مراجع اساسی در این زمینه اسدی (۱۳۹۲) و بارلو^{۲۳} و پروشان^{۲۴} (۱۹۷۵) هستند.

در بسیاری از شاخه های علم آمار مقایسه توزیع های احتمال یا متغیرهای تصادفی دارای اهمیت زیادی است. ترتیب بندی های تصادفی از مهم ترین ابزارها در این راستا و همچنین در مطالعه مفاهیم سالخورده گی هستند. نتایج شناخته شده در زمینه ترتیب های تصادفی توسط شیکد و شانتیکومار (۲۰۰۷) جمع آوری شده است.

با توجه به اهمیت ویژگی های سالخورده گی و ترتیب بندی های تصادفی، در این بخش برخی نتایج مرتبط با توزیع های تعادلی در این زمینه را بیان می کنیم.

قضیه ۱.۴. شرط لازم و کافی برای اینکه توزیع تعادلی مرتبه n توزیعی $IMRL$ ^{۲۵} ($DMRL$ ^{۲۶}) باشد آن است که برای هر x رابطه

^{۲۳}Barlow

^{۲۴}Proschan

^{۲۵} increasing life mean residual

^{۲۶} decreasing life mean residual

زیر برقرار باشد:

$$h^{(n)}(x) \geq (\leq) h^{(n+1)}(x). \quad (10)$$

$m_Y(t)$ که در آن $m_X(t)$ و $m_Y(t)$ به ترتیب توابع میانگین عمر باقیمانده X و Y هستند.

اثبات این قضیه با توجه به دو معادله (۴) و (۵) واضح است. روبرو زیر بین ترتیب‌های فوق برقرار است:

$$lr \Rightarrow hr \Rightarrow st,$$

$$lr \Rightarrow rhr \Rightarrow st,$$

$$hr \Rightarrow mrl.$$

قضیه ۲.۴. توزیع تعادلی طول عمر سیستم متوالی $IMRL$ است

اگر و فقط اگر برای هر x داشته باشیم

$$h_{1:m}^{(1)}(x) \geq h_{1:m}^{(2)}(x). \quad (11)$$

اثبات. از روابط (۵) و (۶) نتیجه می‌شود که رابطه (۱۱) برقرار

است اگر و فقط اگر، داشته باشیم

$$-\frac{d}{dx} \log(h_{1:m}^{(2)}(x)) \geq 0.$$

با استفاده از (۵)، رابطه اخیر معادل با آن است که

$$\frac{d}{dx} \log(m_{1:m}^{(1)}(x)) \geq 0$$

و بدین ترتیب نتیجه مورد نظر به راحتی حاصل می‌شود. □

در پایان این بخش ضمن یادآوری برخی مفاهیم ترتیب‌بندی،

نتایجی را برای توزیع تعادلی اولین آماره ترتیبی ارائه می‌کنیم.

تعریف ۳.۴. فرض کنید X و Y دو متغیر تصادفی به ترتیب با

توابع توزیع $F(x)$ و $G(x)$ ، توابع قابلیت اعتماد $\bar{F}(x)$ و $\bar{G}(x)$ و

توابع چگالی احتمال $f(x)$ و $g(x)$ باشند.

• X را از نظر ترتیب‌بندی تصادفی معمولی کوچکتر از Y

$$(X \leq_{st} Y) \text{ گویند هرگاه برای هر } x, \bar{F}(x) \leq \bar{G}(x).$$

• X را از نظر ترتیب بندی نرخ شکست کوچکتر از Y

$$(X \leq_{hr} Y) \text{ گویند هرگاه } \bar{G}(x)/\bar{F}(x) \text{ تابعی صعودی از } x$$

باشد.

• X را از نظر ترتیب بندی نرخ شکست معکوس کوچکتر از

$$(X \leq_{rhr} Y) \text{ گویند هرگاه } G(x)/F(x) \text{ تابعی صعودی}$$

از x باشد.

• X را از نظر ترتیب بندی نسبت درستنمایی کوچکتر از

$$(X \leq_{lr} Y) \text{ گویند هرگاه } g(x)/f(x) \text{ تابعی صعودی از } x$$

باشد.

• X را از نظر ترتیب بندی میانگین عمر باقیمانده کوچکتر

$$\text{از } Y (X \leq_{mrl} Y) \text{ گویند هرگاه برای هر } t, m_X(t) \leq m_Y(t)$$

قضیه ۴.۴. اگر $X \leq_{hr} Y$ آنگاه

$$X_{1:m}^{(2)} \leq_{lr} Y_{1:m}^{(2)},$$

که در آن $X_{1:m}^{(2)}$ و $Y_{1:m}^{(2)}$ به ترتیب متغیرهای تصادفی متناظر با

توزیع‌های تعادلی اولین آماره‌های ترتیبی هستند.

اثبات. فرض کنید $f_{1:m}^{(2)}(x)$ و $g_{1:m}^{(2)}(x)$ به ترتیب توابع چگالی

احتمال توزیع تعادلی اولین آماره‌های ترتیبی متناظر با X و Y

باشند. به راحتی ملاحظه می‌شود که

$$\frac{g_{1:m}^{(2)}(x)}{f_{1:m}^{(2)}(x)} = \frac{\bar{G}_{1:m}(x)}{\bar{F}_{1:m}(x)},$$

تابعی صعودی از x است و در نتیجه اثبات کامل است. □

نتیجه ۵.۴. اگر $X \leq_{hr} Y$ آنگاه

$$X_{1:m}^{(2)} \leq_* Y_{1:m}^{(2)},$$

که در آن $\leq_*$ هریک از ترتیب‌های تصادفی معمولی، نرخ شکست،

نرخ شکست معکوس و میانگین عمر باقیمانده است.

قضیه ۶.۴. فرض کنید به ازای هر $n = 1, 2, \dots$

$$E[X_{k:m}^{(n)}] = E[Y_{k:m}^{(n)}] \text{ اگر } X \leq_{st} Y \text{ آنگاه } X_{k:m}^{(n)} \leq_{st} Y_{k:m}^{(n)}.$$

اثبات. قضیه را برای حالت $n = 2$ یعنی توزیع تعادلی مرتبه ۱ ثابت

می‌کنیم. اثبات برای مراتب بالاتر از معادله (۲) واضح است. فرض

کنید $X \leq_{st} Y$. در این صورت برای هر x داریم $F(x) \geq G(x)$.

در نتیجه با استفاده از نظریه توزیعی آماره‌های ترتیبی داریم

$$\begin{aligned} P(X_{k:m} > x) &= \int_{F(x)}^1 k \binom{m}{k} t^{k-1} (1-t)^{m-k} dt \\ &\leq \int_{G(x)}^1 k \binom{m}{k} t^{k-1} (1-t)^{m-k} dt \\ &= P(Y_{k:m} > x). \end{aligned}$$

بنابراین اگر $E[X_{k:m}^{(2)}] = E[Y_{k:m}^{(2)}]$ ، آن گاه

$$\int_x^\infty \frac{P(X_{k:m} > t)dt}{E[X_{k:m}]} \leq \int_x^\infty \frac{P(Y_{k:m} > t)dt}{E[Y_{k:m}]},$$

و در نتیجه

$$X_{k:m}^{(2)} \leq_{st} Y_{k:m}^{(2)}.$$

نتیجه ۲.۵. از تعریف $g^{(n)}(x)$ می‌توان رابطه زیر را برای نرخ شکست و میانگین عمر باقیمانده توزیع تعادلی از مرتبه n نتیجه گرفت:

$$h^{(n)}(x) = \frac{g^{(n)}(x)}{S^{(n)}(x-1)} = [m^{(n-1)}(x)]^{-1}.$$

در پایان نتیجه جالبی را برای توزیع تعادلی اولین آماره ترتیبی از توزیع هندسی ارائه می‌کنیم. فرض کنید X دارای توزیع هندسی $Ge(p)$ با تابع جرم احتمال

$$f(x) = pq^x, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

باشد که در آن $q = 1 - p$. همچنین فرض کنید $X^{(n)}$ یک متغیر تصادفی باشد که توزیع آن با توزیع تعادلی X یکسان است. نکته جالب توجه آن است که اگر X دارای توزیع هندسی $Ge(p)$ باشد آن گاه $X^{(n)}$ نیز دارای توزیع $Ge(p)$ است. لذا برای هر $n = 1, 2, \dots$ داریم $h^{(n)}(x) = h(x)$ و $m^{(n)}(x) = m(x)$ به عبارت دیگر، تمام ویژگی‌های احتمالاتی توزیع تعادلی از توزیع هندسی با توزیع پایه یکسان خواهد بود.

ویژگی منحصر بفرد دیگری از توزیع هندسی (در بین توزیع‌های گسسته) آن است که سیستم متوالی شامل m مؤلفه با طول عمرهای مستقل و یکسان هندسی، دارای طول عمر هندسی خواهد بود. لذا نتیجه زیر به راحتی حاصل می‌شود.

قضیه ۳.۵. اگر X دارای توزیع هندسی باشد، آن گاه

$$S_{1:m}^{(n)}(x) = S_{1:m}(x),$$

$$h_{1:m}^{(n)}(x) = h_{1:m}(x),$$

$$m_{1:m}^{(n)}(x) = m_{1:m}(x).$$

۶ بحث و نتیجه گیری

در مقاله حاضر مفهوم توزیع تعادلی در دو حالت پیوسته و گسسته ارائه و به مهم‌ترین ویژگی‌های آن با تکیه بر مفاهیم قابلیت اعتماد اشاره شده است. همچنین چند نتیجه مشخص سازی از توزیع تعمیم یافته پارتو بر اساس توزیع‌های تعادلی بیان شده است. هدف اصلی این مقاله ارائه روابط بین توزیع پایه و توزیع تعادلی از نقطه نظر مفاهیم سالخوردگی و ترتیب‌های تصادفی بوده است. ضمن این که اغلب نتایج برای طول عمر یک سیستم متوالی به دست آمده است.

۵ توزیع‌های تعادلی گسسته

فرض کنید X یک متغیر تصادفی گسسته با تکیه گاه $0, 1, 2, \dots$ تابع جرم احتمال $f(x)$ و تابع قابلیت اعتماد

$$S(x) = \bar{F}(X) = P(X > x)$$

باشد. در این شرایط تابع نرخ شکست و تابع میانگین عمر باقیمانده X به ترتیب به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$h(x) = \frac{f(x)}{S(x-1)},$$

$$m(x) = [S(x)]^{-1} \sum_{t=x}^{\infty} S(t). \quad (12)$$

تابع جرم احتمال توزیع تعادلی از مرتبه n ، $n = 1, 2, \dots$ بر مبنای رابطه بازگشتی زیر تعریف می‌شود:

$$g^{(n)}(x) = \frac{S^{(n-1)}(x)}{\mu^{(n-1)}}, \quad x = 0, 1, \dots, \quad (13)$$

که در آن $S^{(0)}(x) = S(x)$ ، $\mu^{(n-1)} = \sum_{x=0}^{\infty} S^{(n-1)}(x) < \infty$ و $\mu^{(0)} = \mu$ و $S^{(n-1)}(x)$ تابع قابلیت اعتماد توزیع تعادلی مرتبه $n-1$ است.

قضیه ۱.۵. رابطه میان تابع قابلیت اعتماد توزیع پایه و توزیع تعادلی از مرتبه n برای متغیر تصادفی گسسته X به صورت زیر است:

$$S^{(n)}(x) = [\mu^{(n)}]^{-1} S(x+n) \times E[(X-x-1)^{(n)} | X > x+1],$$

که در آن $\mu^{(n)} = E(X^{(n)})$ و

$$X^{(n)} = X(X-1) \cdots (X-n+1).$$

برای اثبات این قضیه می‌توان به نایر و پریس (۲۰۰۹) مراجعه

نمود.

- [۱] اسدی، م. (۱۳۹۲). آشنایی با نظریه قابلیت اعتماد. مرکز نشر دانشگاهی.
- [2] Barlow, R.E. and Proschan, F. (1975). *Statistical Theory of Reliability and Life Testing*. Holt, Rinehart: Winston, New York.
- [3] Cox, D.R. (1962). *Renewal Theory*. Methuen and Co, London.
- [4] Deshpande, J.V. and Kochar, S. C. and Singh, H. (1986). Aspects of positive aging. *Journal of Applied Probability* **23**, 748-758.
- [5] Fagioli, E. and Pellerey, F. (1993). New partial orderings and applications. *Naval Research Logistics* **40**, 829-842.
- [6] Galambos, J. and Kotz, S. (1978). Characterizations of Probability Distributions *Lecture Notes in Mathematics*. Vol 675, Springer, Berlin.
- [7] Gupta, R.C. (1979). On the characterization of survival distributions in reliability by properties of their renewal densities. *Communications in Statistics: Theory and Methods* **98**, 685-697.
- [8] Gupta, R.C. (2007). Role of equilibrium in reliability studies. *Probability in the Engineering and Informational Sciences* **21**, 315-334.
- [9] Gupta, R.C. and Kirmani, S.N.U.A. (1990). Role of weighted distributions in stochastic modelling. *Communications in Statistics: Theory and Methods* **19**, 3147-3162.
- [10] Johnson, N.L., Kotz, S. and Balakrishnan, N. (1994). *Continuous Univariate Distributions*. Vol 1, 2nd edition, Wiley, New York.
- [11] Kagan, A.M., Linnik, Yu.V. and Rao, C.R. (1973). *Characterization Problems in Mathematical Statistics*. Wiley, New York.
- [12] Nair, N.U. and Preeth, M. (2009). On some properties of equilibrium distributions of order n . *Statistical Methods and Applications* **18(4)**, 453-464.
- [13] Nair, N.U., Sankaran, P.G. and Preeth, M. (2012). Reliability aspects of discrete equilibrium distributions. *Communications in Statistics: Theory and Methods* **41**, 500-512.
- [14] Nanda, A.K., Jain, K. and Singh, H. (1996). Properties of moments for s -order equilibrium distributions. *Journal of Applied Probability* **33**, 1108-1111.
- [15] Pakes, A.G. and Navarro, J. (2007). Distributional characterizations through scaling relations. *Australia and New Zealand Journal of Statistics* **49**, 115-135.

- [16] Shaked, M. and Shanthikumar, J.G. (2007). *Stochastic Orders*. Springer, New York.
- [17] Willmot, G.E., Dreikic, S. and Cai, J. (2005). Equilibrium component distributions and stoploss moments. *Scandinavian Actuarial Journal* **1**, 6-24.