

برآورد بیزی پارامتر توزیع پارتول تحت توابع زیان توان دوم خطای لاینکس بر اساس نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار

رضا علیزاده نو قابی، جعفر احمدی

گروه آمار، دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۸/۳۰ تاریخ آخرین بازنگری: ۱۳۹۱/۱۱/۴

چکیده: در برخی از مسئله‌های کاربردی، به دست آوردن مشاهدات اغلب زمان بر و با صرف هزینه همراه می‌باشد. در چنین شرایطی استفاده از یک روش نمونه‌گیری که موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش کارآیی برآوردگرها شود، حائز اهمیت است. در این‌گونه موارد روش نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار جایگزین مناسبی به جای روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به نظر می‌رسد. در این مقاله برآورد بیزی پارامتر توزیع پارتول تحت توابع زیان توان دوم خطای لاینکس، زمانی که داده‌ها به شیوه نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار جمع‌آوری شده باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. به کمک شبیه‌سازی مونت کارلو مخاطره بیزی برآوردگرها محاسبه و در دو روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار هنگامی که از توزیع مزدوج و جفریز به عنوان توزیع پیشین استفاده شود، مقایسه شده‌اند. در انتها با ارائه مثال واقعی برآوردگرهای به دست آمده ارزیابی شده‌اند. نتایج به دست آمده حاکی از برتری روش نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار است، بنابراین توصیه می‌شود اگر شرایط برای انجام نمونه‌گیری به روش مجموعه رتبه‌دار فراهم باشد، از این طرح نمونه‌گیری استفاده شود.

واژه‌های کلیدی: نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار، برآورد بیزی، تابع زیان لاینکس، تابع زیان توان دوم خطأ، معیار نزدیکی پیتمن.

۱ مقدمه

نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار اولین بار توسط مکاینتایر (۱۹۵۲) معرفی شد. در این شیوه ابتدا به تصادف n واحد نمونه از جامعه مورد بررسی را انتخاب نموده سپس آن‌ها را به طور تصادفی به n زیر نمونه به اندازه n تقسیم کرده و واحدهای نمونه را بر اساس روشی که نیاز به اندازه‌گیری دقیق نباشد به ترتیب صعودی مرتب می‌کنند. واحد دارای کوچکترین رتبه در اولین زیر نمونه و واحد دارای دومین رتبه در زیر نمونه دوم و به همین ترتیب واحد دارنده بزرگترین رتبه در زیر نمونه آخر انتخاب می‌شوند. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به چن و همکاران (۲۰۰۳) مراجعه شود. این روش نمونه‌گیری در بسیاری از مسائل به کار برده می‌شود و علاوه بر افزایش دقت برآوردگرها در مواردی منجر به کاهش هزینه نیز می‌گردد. به عنوان مثال در مسائل زیست محیطی برای برآورد مقدار آلاینده در اطراف یک نیروگاه هسته‌ای بررسی می‌شود که آیا آلاینده‌گی خاک اطراف نیروگاه در سطح نرمال است یا خیر. برای این کار ابتدا نمونه‌هایی انتخاب می‌شوند، سپس با انجام آزمایش‌های بسیار پرهزینه مقدار متغیرهای مورد نظر اندازه‌گیری می‌گردند. روشی مناسب برای این منظور نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار است. در واقع ممکن است به صورت بصری و بر اساس ویژگی‌های فیزیکی مانند رنگ، بافت و بو قبل از تحلیل دقیق بتوان مقدار تقریبی متغیر مورد بررسی در خاک را ارائه داد. نمونه‌هایی که به روش نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار گزینش شده‌اند، برای اندازه‌گیری دقیق به آزمایشگاه ارسال می‌شوند. برای مثال‌های بیشتر می‌توان به ناسبوآم و سینها (۱۹۹۷)، یو و لم (۱۹۹۷)، مدو همکاران (۱۹۹۹) و پاتیل و همکاران (۱۹۹۹) مراجعه کرد. اگر رتبه‌بندی داده‌ها آسان‌تر از اندازه‌گیری دقیق آن‌ها باشد، استفاده از روش نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار مفید است. برای مثال بیشتر در منابع فارسی می‌توان به زمانزاده و احمدی (۱۳۹۰) و امینی و ارقامی (۱۳۸۷) مراجعه نمود.

بسیاری از پژوهش‌گران مسئله برآورد پارامترهای برخی از توزیع‌های آماری را بر اساس نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار مطالعه نموده‌اند. در این میان سینها و همکاران (۱۹۹۶) و شیبو و موبلک (۲۰۰۴) بهترین برآوردهای نالریب خطی برای توزیع‌های نرمال، نمایی و گاما را برآورد کرده‌اند. بیشتر مقاله‌های موجود در مورد برآوردهای پارامترها به صورت کلاسیک می‌باشد و مقالات بسیار کمی به استنباط بیزی زمانی که داده‌ها به شیوه نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار استخراج شده باشند، پرداخته‌اند که از جمله می‌توان به تحقیقات انجام شده توسط الصالح و همکاران (۲۰۰۰) و سادک و همکاران (۲۰۱۳) اشاره کرد که توزیع آماری تحت مطالعه را نیز نمایی در نظر گرفته‌اند.

در این مقاله با استفاده ازتابع زیان لاینکس^۱ پارامتر توزیع پارتی بر مبنای داده‌های نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار برآورد می‌شود. در بخش‌های ۳ و ۴ به ترتیب برآوردهای بیزی توزیع پارتی بر اساس توزیع‌های پیشین گاما و جفریز به دست آورده می‌شوند. همچنین برآوردهای درستنمایی ماکسیمم محاسبه شده و با حالت توزیع پیشین جفریز مقایسه می‌شود. در بخش ۵ نتایج مقایسه مخاطره بیزی برآوردهای به کمک شبیه‌سازی آورده شده است. برای مقایسه برآوردهای بیزی تحت دو تابع زیان متفاوت از معیار نزدیکی پیتمان (پیتمان، ۱۹۳۷) استفاده شده است. اگر δ_1 و δ_2 دو برآوردهای پارامتر θ باشند آنگاه نزدیکی پیتمان δ_1 نسبت به δ_2 در خصوص θ به صورت

$$PMC(\delta_1, \delta_2 | \theta) = P\{|\delta_1 - \theta| < |\delta_2 - \theta|\}, \quad \theta \in \Theta$$

تعریف می‌شود، که در آن Θ فضای پارامتر است. بنابراین تعریف برآوردهای δ_1 نسبت به δ_2 پیتمان نزدیک‌تر به θ است اگر $PMC(\delta_1, \delta_2 | \theta) \geq 0.5$ و $\theta \in \Theta$ بازی هر $\theta \in \Theta$ نامساوی اکید حداقل برای یک $\theta \in \Theta$ برقرار باشد. برای جزئیات بیشتر در خصوص معیار پیتمان، مطالعه تک‌نگاشت کیتینگ و همکاران (۱۹۹۳) به علاقه‌مندان توصیه می‌شود. در بخش ۶ بر اساس داده‌های میزان خسارات باد مربوط به سال ۱۹۷۷ برگرفته از هوگ و کلامن (۱۹۸۴) کارایی برآوردهای به دست آمده مورد

^۱ Linex

بررسی قرار می‌گیرد.

۲ مفاهیم اولیه

متغیر تصادفی X دارای توزیع پارتتو با پارامتر شکل α و پارامتر مقیاس β است، هرگاه تابع چگالی آن به صورت

$$f_{\alpha}(x) = \frac{\alpha \beta^{\alpha}}{x^{\alpha+1}}; \quad x \geq \beta, \quad \alpha > 0, \beta > 0.$$

باشد. بسیاری از پدیده‌های اجتماعی، علمی و ژئوفیزیکی توزیع پارتتو توصیف می‌شوند. این توزیع در مباحث طول عمر و قابلیت اعتقاد دارای اهمیت فراوان است. یکی از کاربردهای این توزیع در مباحث اقتصاد است که غالباً برای توصیف توزیع درآمد بین افراد جامعه استفاده می‌شود. برآورد پارامتر توزیع پارتتو تحت نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار به روش‌های کلاسیک بررسی شده است که از جمله می‌توان به ابودیاح و همکاران (۲۰۱۱) اشاره کرد. در این مقاله برآوردگرهای بیزی برای پارامتر α بر اساس نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار ارائه می‌شود. در ادامه بدون از دست دادن کلیت مسئله مقدار β معلوم و برابر یک فرض شده است. توزیع پیشین مزدوج برای α به صورت

$$\pi_1(\alpha) = \frac{\theta^k}{\Gamma(k)} \alpha^{k-1} e^{-\alpha\theta}; \quad \alpha > 0. \quad (1)$$

است که توزیع گاما با پارامترهای k و θ است. همچنین توزیع پیشین جفریز به منظور امکان مقایسه با برآوردگر کلاسیک درستنایی ماکسیمم استفاده شده است که

$$\pi_2(\alpha) \propto \frac{1}{\alpha}; \quad \alpha > 0. \quad (2)$$

از توابع زیان متفاوت توان دوم خطأ و نامتقارن لاینکس برای برآورد α استفاده خواهد شد که به ترتیب به صورت

$$\begin{aligned} L_1(\theta, \delta) &= (\theta - \delta)^2, \\ L_2(\theta, \delta) &= b \{ \exp(c(\theta - \delta)) - c(\theta - \delta) - 1 \}, \quad c \neq 0, b > 0. \end{aligned}$$

هستند، که در آن b و c ثابت هستند و c شکل تابع زیان را مشخص می‌سازد و b برای مقیاس به کار برده می‌شود. به ازای $1 = c$ ، تابع زیان حول صفر نامتقارن و باعث بیش برآورده می‌شود. به طور کلی اگر $0 < c$ ، تابع زیان لاینکس به صورت خطی برای مقادیر منفی خطا و نمایی برای مقادیر مثبت خطا افزایش می‌یابد. برای مقادیر مثبت و کوچک c یعنی $0 < c \leq z$ تابع زیان متقارن و نزدیک به تابع زیان توان دوم خطا است. برای $1 - c = c$ نیز تابع زیان لاینکس نامتقارن است و باعث کم برآورده می‌شود. اگر $0 < c$ باشد، تابع زیان لاینکس برای مقادیر منفی خطا به صورت نمایی و برای مقادیر مثبت خطا به صورت خطی زیاد می‌شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد تابع زیان لاینکس به چانگ و هانگ (۲۰۰۷) و برای نحوه انتخاب توابع زیان به برگر (۱۹۸۵) مراجعه شود.

۳ برآورده گر بیزی

در این بخش برآورده گر بیزی پارامتر α تحت توابع زیان توان دوم خطا و لاینکس با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده و نمونه گیری مجموعه رتبه دار به دست آورده می‌شود. در ادامه از $\pi_{SRS}(\alpha|x)$ و $\pi_{RSS}(\alpha|y)$ به ترتیب برای نمایش توابع چگالی پسین نمونه گیری تصادفی ساده و نمونه گیری مجموعه رتبه دار استفاده می‌شود. همچنین نمادهای $\hat{\alpha}_L(RSS)$ ، $\hat{\alpha}_S(SRS)$ ، $\hat{\alpha}_S(RSS)$ و $\hat{\alpha}_L(SRS)$ به ترتیب برای برآورده گرهای بیزی α تحت تابع زیان توان دوم خطا و لاینکس بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده و رتبه دار استفاده خواهد شد.

۱.۳ برآورده گر بیزی بر اساس نمونه گیری به شیوه تصادفی ساده

فرض کنید X_1, \dots, X_n نمونه‌ای تصادفی از توزیع پارتولو با پارامتر α و توزیع پیشین مزدوج $(\alpha)_1 \pi$ در رابطه (۱) باشد. توزیع پسین را می‌توان به صورت

$$\pi_{SRS}(\alpha|x) = \frac{1}{\Gamma(n+k)} \left(\sum_{i=1}^n \log(x_i) + \theta \right)^{n+k} \alpha^{n+k-1} e^{-\alpha \left(\sum_{i=1}^n \log(x_i) + \theta \right)}. \quad (3)$$

نوشت، که در آن $x = (x_1, \dots, x_n)$ بردار مشاهدات است.

برآورده‌گر بیزی تحت تابع زیان توان دوم خطای میانگین توزیع پسین، به صورت

$$\hat{\alpha}_S(SRS) = \frac{n+k}{\sum_{i=1}^n \log(X_i) + \theta}. \quad (4)$$

است. واریان (۱۹۷۵) نشان داد که برآورده‌گر بیزی تحت تابع زیان لاینکس به صورت

$$\hat{\alpha}_L(SRS) = \frac{-1}{c} \log(E(e^{-c\alpha}|X)). \quad (5)$$

است. با استفاده از رابطه (۳) داریم

$$\begin{aligned} E(e^{-c\alpha}|x) &= A \int_0^\infty \frac{e^{-c\alpha}}{\Gamma(n+k)} \left(\sum_{i=1}^n \log(x_i) + \theta \right)^{n+k} \alpha^{n+k-1} e^{-\alpha(\sum_{i=1}^n \log(x_i) + \theta)} d\alpha \\ &= \frac{\left(\sum_{i=1}^n \log(x_i) + \theta \right)^{n+k}}{\Gamma(n+k)} \int_0^\infty \alpha^{n+k-1} e^{-\alpha(\sum_{i=1}^n \log(x_i) + \theta + c)} d\alpha \quad (6) \\ &= \left(1 + \frac{c}{\sum_{i=1}^n \log(x_i) + \theta} \right)^{-(n+k)}. \end{aligned}$$

با توجه به (۵) نتیجه می‌شود که

$$\hat{\alpha}_L(SRS) = \frac{n+k}{c} \log \left(1 + \frac{c}{\sum_{i=1}^n \log(X_i) + \theta} \right). \quad (7)$$

از (۴) و (۷) به سادگی می‌توان نشان داد که اگر $c \rightarrow \infty$ آنگاه $\hat{\alpha}_L(SRS) \rightarrow \hat{\alpha}_S(SRS)$

۲.۳ برآورده گر بیزی بر اساس نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار

فرض کنید Y_1, \dots, Y_n نمونه‌های یک چرخه بر اساس نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار از توزیع پارتیو باشند.تابع چگالی زمین آماره مرتب به صورت

$$h_\alpha(y_j) = j \binom{n}{j} f_\alpha(y_j) [F_\alpha(y_j)]^{j-1} [1 - F_\alpha(y_j)]^{n-j}$$

$$\begin{aligned} &= j \binom{n}{j} \frac{\alpha}{(1+y_j)} (1 - (\frac{1}{1+y_j})^\alpha)^{j-1} (\frac{1}{1+y_j})^{\alpha(n-j-1)} \\ &= \sum_{t=0}^{j-1} C_t(j) g_t(y_j), \quad y_j > 0, \end{aligned}$$

است، که در آن

$$C_t(j) = j \binom{n}{j} \binom{j-1}{t} (-1)^t,$$

$$g_t(y_j) = \alpha \exp(-\alpha(1+n-j+t) \log(1+y_j)) \exp(-\log(1+y_j)).$$

بنابراین تابع درستنمایی نمونه‌هایی که به روش نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار استخراج شده است، به صورت

$$\begin{aligned} L_{RSS}(\alpha) &= \prod_{j=1}^n h_\alpha(y_j) \\ &= \prod_{j=1}^n \sum_{t=0}^{j-1} C_t(j) g_t(y_j) \\ &= \sum_{i_1=0}^n \sum_{i_2=0}^1 \dots \sum_{i_n=0}^{n-1} [\prod_{j=1}^n C_{i_j}(j)] \alpha^n \exp(-\alpha A_{\mathbf{i}}(\mathbf{y})) e^{(-\sum_{j=1}^n \log(1+y_j))}, \end{aligned} \quad (\lambda)$$

حاصل می‌شود، که در آن $\mathbf{i} = (i_1, \dots, i_n)$ $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$

$$A_{\mathbf{i}}(\mathbf{y}) = \sum_{j=1}^n (1 + n - j + i_j) \log(1 + y_j),$$

با استفاده از (λ) تابع چگالی پسین را می‌توان به صورت

$$\pi_{RSS}(\alpha | \mathbf{y}) = \frac{\sum_{i_1=0}^n \sum_{i_2=0}^1 \dots \sum_{i_n=0}^{n-1} [\prod_{j=1}^n C_{i_j}(j)] \alpha^{n+k-1} \exp(-\alpha(A_{\mathbf{i}}(\mathbf{y}) + \theta))}{\sum_{i_1=0}^n \sum_{i_2=0}^1 \dots \sum_{i_n=0}^{n-1} [\prod_{j=1}^n C_{i_j}(j)] \Gamma(n+k) (A_{\mathbf{i}}(\mathbf{y}) + \theta)^{-(n+k)}}. \quad (\eta)$$

نوشت. از رابطه (۹) برآورده بیزی پارامتر α تحت تابع زیان توان دوم خطابه صورت

$$\hat{\alpha}_S(RSS) = \frac{\sum_{i_1=0}^{\circ} \sum_{i_2=0}^{\circ} \dots \sum_{i_n=0}^{n-1} [\prod_{j=1}^n C_{ij}(j)](n+k)(A_i(\mathbf{Y}) + \theta)^{-(n+k+1)}}{\sum_{i_1=0}^{\circ} \sum_{i_2=0}^{\circ} \dots \sum_{i_n=0}^{n-1} [\prod_{j=1}^n C_{ij}(j)]\Gamma(n+k)(A_i(\mathbf{Y}) + \theta)^{-(n+k)}}$$

به دست می‌آید. به کمک رابطه (۵) برآورده بیزی پارامتر α تحت تابع زیان لاینکس به دست آورده می‌شود، در این صورت داریم

$$E(e^{-c\alpha}|\mathbf{y}) = \frac{\sum_{i_1=0}^{\circ} \sum_{i_2=0}^{\circ} \dots \sum_{i_n=0}^{n-1} [\prod_{j=1}^n C_{ij}(j)](A_i(\mathbf{y}) + \theta + c)^{-(n+k)}}{\sum_{i_1=0}^{\circ} \sum_{i_2=0}^{\circ} \dots \sum_{i_n=0}^{n-1} [\prod_{j=1}^n C_{ij}(j)](A_i(\mathbf{y}) + \theta)^{-(n+k)}}.$$

بنابراین

$$\hat{\alpha}_L(RSS) = \frac{-1}{c} \log[E(e^{-c\alpha}|\mathbf{Y})].$$

برای رسیک برآورده‌گرها صورت تابعی بسته‌ای به دست نیامده اما به وسیله شبیه‌سازی انجام شده و نتایج حاصل در بخش ۵، جدول ۲ آمده است.

۳.۳ برآورده‌گر بیزی بر اساس توزیع پیشین ناآگاهی بخش

فرض کنید α دارای توزیع پیشین ناآگاهی بخش (۲) باشد. برآورده‌گرهای بیزی در حالت نمونه‌گیری تصادفی ساده مشابه بخش ۱.۳ به صورت

$$\begin{aligned} \hat{\alpha}_S^J(SRS) &= \frac{n}{\sum_{j=1}^n \log(X_j)}, \\ \hat{\alpha}_L^J(SRS) &= \frac{n}{c} \log \left(1 + \frac{c}{\sum_{j=1}^n \log(X_j)} \right), \end{aligned}$$

به دست می‌آیند، که در آن‌ها اندیس بالای J برای توزیع پیشین جفریز استفاده شده است. در اینجا نیز اگر $c \rightarrow 0$ ملاحظه می‌شود که $\hat{\alpha}_S^J(SRS) \rightarrow \hat{\alpha}_L^J(SRS)$. در

طرح نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار بعد از محاسبه توزیع پسین نتایج زیر تحت دوتابع زیان توان دوم خطأ و لاینکس حاصل می‌شود.

$$\hat{\alpha}_S^J(RSS) = n \frac{\sum_{i_1=0}^{\circ} \sum_{i_2=0}^{\circ} \dots \sum_{i_n=0}^{n-1} [\prod_{j=1}^n C_{i_j}(j)] (A_i(\mathbf{Y}))^{-(n+1)}}{\sum_{i_1=0}^{\circ} \sum_{i_2=0}^{\circ} \dots \sum_{i_n=0}^{n-1} [\prod_{j=1}^n C_{i_j}(j)] (A_i(\mathbf{Y}))^{-n}},$$

$$\hat{\alpha}_L^J(RSS) = \frac{-1}{c} \log \left[\frac{\sum_{i_1=0}^{\circ} \sum_{i_2=0}^{\circ} \dots \sum_{i_n=0}^{n-1} [\prod_{j=1}^n C_{i_j}(j)]}{\sum_{i_1=0}^{\circ} \sum_{i_2=0}^{\circ} \dots \sum_{i_n=0}^{n-1} [\prod_{j=1}^n C_{i_j}(j)]} \left(1 + \frac{c}{A_i(\mathbf{Y})} \right)^{-n} \right].$$

لازم به ذکر است اگر نمونه‌گیری بر مبنای m چرخه انجام شود، نتایج مشابهی به دست می‌آید.

۴ برآوردگر درستنمایی ماکسیمم بر اساس نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار

فرض کنید X_1, \dots, X_n نمونه‌ای تصادفی باشد که بر اساس نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار از توزیع پارتو استخراج شده باشد، داریم

$$L_{RSS}(\alpha) = \prod_{j=1}^n [j \binom{n}{j}] \alpha^n \prod_{j=1}^n [1 - \frac{1}{x_j^\alpha}]^{j-1} \prod_{j=1}^n [\frac{1}{x_j}]^{\alpha(n-j)} \prod_{j=1}^n [\frac{1}{x_j}]^{\alpha+1}.$$

بنابراین

$$\frac{\partial \log(L_{RSS}(\alpha))}{\partial \alpha} = \frac{n}{\alpha} + \sum_{j=1}^n [(j-1) \log(x_j) (\frac{1}{1 - \frac{1}{x_j^\alpha}}) - n \log(x_j)] = 0. \quad (10)$$

از طرفی $\frac{\partial^2 \log(L_{RSS}(\alpha))}{\partial \alpha^2} < 0$ ، در نتیجه ریشه معادله (10) برآوردگر درستنمایی ماکسیمم α است. در اینجا با استفاده از روش نیوتون-رافسون جواب‌ها را به دست آورده و با برآوردگر بیزی زمانی که از توزیع پیشین ناآگاهی بخشن استفاده شود، مقایسه شده است. نتایج شبیه‌سازی در جدول ۳ آورده شده است.

۵ مطالعه شبیه‌سازی

برای مقایسه برآوردها دو معیار مخاطره آنها و معیار نزدیکی پیتمن در نظر گرفته شده است. چون محاسبه آنها به صورت تحلیلی امکان پذیر نبود، این کار به وسیله شبیه‌سازی مونت کارلو انجام شده است. برای این منظور مراحل زیر دنبال می‌شود.

۱. از توزیع پیشین (1) ، α تولید می‌شود.
۲. از توزیع پارتوا پارامتر α ، داده به اندازه n تولید می‌شود.
۳. عبارت‌های $d_1(i) = e^{c(\hat{\alpha}_i - \alpha_0)} - c(\hat{\alpha}_i - \alpha_0) - 1$ و $d_2(i) = (\hat{\alpha}_i - \alpha_0)^2$ محاسبه می‌شود. در اینجا منظور از $\hat{\alpha}_i$ یکی از برآوردهای معرفی شده در این مقاله است.
۴. مراحل ۱ تا 3 را $N = 10000$ بار تکرار نموده و عبارت‌های

$$\begin{aligned} ER(SEL)(\hat{\alpha}_i) &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N d_1(i), \\ ER(LINEX)(\hat{\alpha}_i) &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N d_2(i). \end{aligned}$$

محاسبه می‌شوند، که در آن نماد ER برای برآورد مخاطره استفاده شده است.

۵. معیار پیتمن نیز به صورت

$$EPMC(\hat{\alpha}_1, \hat{\alpha}_2 | \alpha) = \frac{1}{N} \# [|\hat{\alpha}_1 - \alpha_0| < |\hat{\alpha}_2 - \alpha_0|]$$

محاسبه می‌شود. حال برای پارامترهای توزیع پیشین نیز سه مورد در نظر گرفته می‌شود. در اینجا با ثابت نگه داشتن میانگین توزیع پیشین، سه حالت برای واریانس آن در نظر گرفته شده است. به جدول ۱ دقت شود.

نتایج شبیه‌سازی در جداول ۲ تا ۵ آمده است. از جداول ۲ تا ۵ موارد زیر

مالحظه می‌شود:

۱. جدول ۲ بیانگر آن است که با افزایش حجم نمونه مخاطره بیزی کاهش می‌یابد.
۲. برآوردهای بیزی بر مبنای نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار، مخاطره بیزی بسیار کمتری نسبت به حالت نمونه‌گیری تصادفی ساده دارند.
۳. در هر دو طرح نمونه‌گیری مخاطره بیزی در حالت توزیع پیشین ناگاهی بخش بیشتر از حالتی است که از توزیع پیشین مزدوج استفاده گردد.

جدول ۱: میزان اطلاع در حالت میانگین ثابت

$Var(\alpha)$	$E(\alpha)$	θ	k	
۰/۲۵	۰/۵	۲	۱	اطلاع کم
۰/۰۵	۰/۵	۱۰	۵	اطلاع متوسط
۰/۰۰۵	۰/۵	۲۰	۱۰	اطلاع زیاد

۴. با افزایش میزان اطلاع (با تغییر k و θ) مخاطره بیزی کاهش می‌یابد.
۵. جدول ۳ بیانگر این است که برآورده‌گر درستنمایی ماکسیمم و برآورده‌گر بیزی تحت تابع زیان توان دوم خطأ و توزیع پیشین جفریز تقریباً با هم برابرند، که مطابق انتظار است.
۶. بنابر جداول ۴ و ۵ از نظر معیار نزدیکی پیشمن برآورده‌گرهای بیزی تحت نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار بهتر از برآورده‌گرهای بیزی تحت نمونه‌گیری تصادفی ساده می‌باشند.
۷. بنابر جداول ۴ و ۵ برآورده‌گر بیزی تحت تابع زیان توان دوم خطأ بهتر از برآورده‌گر بیزی تحت تابع زیان لاینکس برای $c = 1$ است و برای $c = -1$ برآورده‌گر بیزی تحت تابع زیان لاینکس بهتر از برآورده‌گر بیزی تحت تابع زیان توان دوم خطأ است.

۶ داده‌های مربوط به خسارات باد

در این بخش به منظور تشریح کارآیی برآورده‌گرهای پیشنهاد شده، داده‌های میزان خسارات باد در سال ۱۹۷۷ از کتاب هوگ و کلاگمن (۱۹۸۴) مورد بررسی قرار می‌گیرند. این داده‌ها شامل ۳۶ مقدار گرد شده خسارات باد بر حسب میلیون دلار است و در جدول ۶ آمده است. ریزو (۲۰۰۹) نشان داد که داده‌ها از توزیع پارتو با پارامتر مقیاس $1/5$ و پارامتر شکل $0/764$ پیروی می‌کنند. بعد از تغییر مقیاس داده‌ها نمونه‌ای به حجم ۶ به دو روش نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار و نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین همین داده‌ها استخراج کرده و برآورد پارامتر α و مخاطره بیزی

جدول ۲: مخاطره بیزی برآوردها به کمک شبیه‌سازی مونت کارلو

LINEX				c	SEL				θ	k	n				
گاما		جفریز			گاما		جفریز								
RSS	SRS	RSS	SRS		RSS	SRS	RSS	SRS							
۰/۰۱۵۳	۰/۰۲۶۰	۰/۰۲۳۱	۰/۱۰۷۰	۱	۰/۰۳۲۷	۰/۰۶۳۵	۰/۰۴۰۸	۰/۲۲۹۰	۲	۱	۴				
۰/۰۱۷۴	۰/۰۳۸۸	۰/۰۲۵۲	۰/۰۳۸۸	-1											
۰/۰۰۶۰	۰/۰۰۶۸	۰/۰۲۴۳	۰/۱۱۷۵	1	۰/۰۱۲۹	۰/۰۱۳۳	۰/۰۵۰۱	۰/۲۵۸۸	۱۰	۵					
۰/۰۰۶۹	۰/۰۰۷۸	۰/۰۲۶۱	۰/۱۰۷۸	-1											
۰/۰۰۳۰	۰/۰۰۳۱	۰/۰۲۴۳	۰/۱۰۹۵	1	۰/۰۰۶۳	۰/۰۰۶۶	۰/۰۵۰۱	۰/۲۴۳۶	۲۰	۱۰					
۰/۰۰۳۳	۰/۰۰۳۶	۰/۰۲۶۱	۰/۱۴۷۱	-1											
۰/۰۱۰۴	۰/۰۲۴۱	۰/۰۱۳۱	۰/۰۶۱۱	1	۰/۰۲۱۷	۰/۰۵۶۱	۰/۰۲۷۱	۰/۱۳۳۷	۲	۱	۵				
۰/۰۱۱۲	۰/۰۳۲۴	۰/۰۱۴۰	۰/۰۷۶۶	-1											
۰/۰۰۵۳	۰/۰۰۵۷	۰/۰۱۳۶	۰/۰۷۹۶	1	۰/۰۱۱۲	۰/۰۱۳۰	۰/۰۲۷۳	۰/۱۵۶۳	۱۰	۵					
۰/۰۰۵۸	۰/۰۰۷۴	۰/۰۱۴۰	۰/۰۹۹۵	-1											
۰/۰۰۳۰	۰/۰۰۳۱	۰/۰۱۳۳	۰/۰۷۷۹	1	۰/۰۰۶۴	۰/۰۰۶۷	۰/۰۲۷۳	۰/۱۵۰۲	۲۰	۱۰					
۰/۰۰۳۳	۰/۰۰۳۵	۰/۰۱۴۰	۰/۰۶۰۱	-1											
۰/۰۰۷۵	۰/۰۲۱۸	۰/۰۰۸۸	۰/۰۴۸۶	1	۰/۰۱۵۴	۰/۰۴۸۷	۰/۰۱۸۰	۰/۰۹۸۶	۲	۱	۶				
۰/۰۰۷۹	۰/۰۲۷۱	۰/۰۰۹۱	۰/۰۵۳۳	-1											
۰/۰۰۴۵	۰/۰۰۶۰	۰/۰۰۸۶	۰/۰۴۷۸	1	۰/۰۰۹۳	۰/۰۱۳۰	۰/۰۱۷۶	۰/۱۰۱۱	۱۰	۵					
۰/۰۰۴۸	۰/۰۰۷۴	۰/۰۰۹۰	۰/۰۵۴۴	-1											
۰/۰۰۲۰	۰/۰۰۲۵۰	۰/۰۰۸۶	۰/۰۴۹۷	1	۰/۰۰۵۹	۰/۰۰۶۵	۰/۰۱۷۶	۰/۱۰۶۳	۲۰	۱۰					
۰/۰۰۲۷	۰/۰۰۳۹	۰/۰۰۸۹	۰/۰۵۱۳	-1											

رضا علیزاده نوابی، جعفر احمدی ۲۱۳.....

جدول ۳: مقایسه برآوردهای $\hat{\alpha}_S^J(RSS)$ با $\hat{\alpha}_{ML}(RSS)$ و میانگین توان دوم خطای آنها برای $\alpha = 2$

$MSE(\hat{\alpha}_{ML}(RSS))$	$ER(\hat{\alpha}_S^j(RSS))$	$\hat{\alpha}_S^J(RSS)$	$\hat{\alpha}_{ML}$	n
۰/۷۱۳۳	۰/۶۸۷۱	۲/۲۲۹۸	۲/۲۱۹۶	۱۰
۰/۲۹۹۱	۰/۲۵۸۶	۲/۱۰۴۹	۲/۱۰۳۲	۲۰
۰/۱۷۸۲	۰/۱۰۶۱	۲/۰۶۸۷	۲/۰۶۷۸	۳۰

جدول ۴: مقایسه برآوردها از نظر معیار پیتمن برای $k = 5$ و $\theta = 10$

n	معیار پیتمن			
۶	۵	۴	c	
۰/۳۷۸۲	۰/۴۰۷۳	۰/۴۲۴۰	۱	$\hat{\alpha}_L(RSS)$ v.s. $\hat{\alpha}_L(SRS)$
۰/۳۸۰۵	۰/۴۰۹۳	۰/۴۲۷۵	-۱	
۰/۳۷۷۸	۰/۴۰۷۱	۰/۴۲۳۲		$\hat{\alpha}_S(RSS)$ v.s. $\hat{\alpha}_S(SRS)$
۰/۴۸۲۵	۰/۴۷۰۹	۰/۴۷۲۵	۱	$\hat{\alpha}_S(SRS)$ v.s. $\hat{\alpha}_L(SRS)$
۰/۵۴۵۷	۰/۵۵۶۶	۰/۵۶۱۷	-۱	
۰/۴۷۶۴	۰/۴۸۱۵	۰/۴۷۸۸	۱	$\hat{\alpha}_S(RSS)$ v.s. $\hat{\alpha}_L(RSS)$
۰/۵۴۴۱	۰/۵۴۱۳	۰/۵۴۶۳	-۱	

جدول ۵: مقایسه برآوردها از نظر معیار پیتمن برای $k = 10$ و $\theta = 20$

n	معیار پیتمن			
۶	۵	۴	c	
۰/۴۰۸۹	۰/۴۱۰۱	۰/۴۲۳۸	۱	$\hat{\alpha}_L(RSS)$ v.s. $\hat{\alpha}_L(SRS)$
۰/۴۰۸۴	۰/۴۱۳۸	۰/۴۳۶۰	-۱	
۰/۴۱۰۴	۰/۴۱۷۸	۰/۴۳۴۷		$\hat{\alpha}_S(RSS)$ v.s. $\hat{\alpha}_S(SRS)$
۰/۴۸۰۲	۰/۴۷۷۷	۰/۴۷۸۶	۱	$\hat{\alpha}_S(SRS)$ v.s. $\hat{\alpha}_L(SRS)$
۰/۵۴۱۲	۰/۵۴۰۴	۰/۵۰۰۰	-۱	
۰/۴۸۷۹	۰/۴۸۱۲	۰/۴۸۰۲	۱	$\hat{\alpha}_S(RSS)$ v.s. $\hat{\alpha}_L(RSS)$
۰/۵۲۹۴	۰/۵۳۹۴	۰/۵۴۴۶	-۱	

۲۱۴ نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار

برآورده‌گرها در این دو روش به کمک شبیه‌سازی مونت کارلو با ۱۰۰۰۰ بار تکرار به دست آورده و در جداول ۷ و ۸ خلاصه شده‌اند.

جدول ۶: خسارات باد بر حسب میلیون دلار										
۳۲	۲۶	۶	۲	۲	۶	۴	۶	۲	۲	۲۲
۲	۵	۵	۹	۶	۲	۲	۱۵	۲		
۲	۲	۱۷	۲۵	۸	۳	۳	۲	۲۴		
۳	۴	۲	۲۷	۵	۵	۴۳	۲	۲۴		

همان‌طور که در جدول ۷ ملاحظه می‌شود مقدار برآورد شده به مقدار واقعی نزدیک است. جدول ۸ نیز نتایج بخش شبیه‌سازی شامل جدول ۲ را تایید می‌کند و مهمترین نکته‌ای که دوباره روی آن تاکید می‌شود، کوچک بودن ریسک بیزی برآورده‌گرها در روش نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار نسبت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده است.

جدول ۷: برآورد پارامتر برای داده‌های خسارات باد (مقدار واقعی α برابر $0/764$ است)

LINEX					SEL						
گاما		جفریز			گاما		جفریز				
RSS	SRS	RSS	SRS	c	RSS	SRS	RSS	SRS	θ	k	
۰/۷۰۶۴	۰/۷۱۱۱	۰/۷۲۴۴	۰/۷۷۹۸	۱	۰/۷۱۹۶	۰/۷۵۰۷	۰/۷۳۹۳	۰/۸۳۸۶	۲	۱	
۰/۷۳۳۶	۰/۷۹۷۲	۰/۷۵۰۱	۰/۹۱۴۰	-۱							
۰/۶۵۶۶	۰/۶۰۸۴	۰/۷۲۷۹	۰/۷۷۹۷	۱	۰/۶۶۵۸	۰/۶۲۵۸	۰/۷۳۷۸	۰/۸۳۸۶	۱۰	۵	
۰/۶۷۵۴	۰/۶۴۴۶	۰/۷۵۴۵	۰/۹۱۳۷	-۱							
۰/۶۲۱۵	۰/۵۶۷۴	۰/۷۴۴۷	۰/۷۷۵۳	۱	۰/۶۲۸۲	۰/۵۷۷۶	۰/۷۳۹۶	۰/۸۳۳۱	۲۰	۱۰	
۰/۶۳۵۱	۰/۵۸۸۴	۰/۷۵۵۴	۰/۹۰۶۴	-۱							

۷ بحث و نتیجه‌گیری

در مسائل آماری به دست آوردن داده‌ها از طریق فرآیندی دقیق که بتوان با صحت و دقیقت بیشتر در مورد خصیصه‌های جامعه اظهار نظر کرد، یکی از اصول اساسی است. در شرایطی که در آن اندازه‌گیری دقیق مشاهدات نمونه به دلایلی چون هزینه،

جدول ۸: مخاطره بیزی برآوردهای داده‌های خسارات باد

LINEX						SEL					
Gamma		Jeffrys		<i>c</i>	Gamma		Jeffrys		θ	<i>k</i>	
RSS	SRS	RSS	SRS		RSS	SRS	RSS	SRS			
۰/۰۰۸۷	۰/۰۱۵۳	۰/۰۰۹۹	۰/۰۰۳۵۶	۱	۰/۰۱۷۸	۰/۰۰۳۴۷	۰/۰۲۰۵	۰/۰۰۸۸۲	۲	۱	
۰/۰۰۹۰	۰/۰۲۰۷	۰/۰۱۰۶	۰/۰۰۵۵۲	-1							
۰/۰۰۸۸	۰/۰۱۳۹	۰/۰۰۹۹	۰/۰۰۳۵۱	۱	۰/۰۱۷۲	۰/۰۰۲۵۳	۰/۰۲۰۴	۰/۰۰۸۷۳	۱۰	۵	
۰/۰۰۸۳	۰/۰۱۱۳	۰/۰۱۰۶	۰/۰۰۵۴۸	-1							
۰/۰۱۱۴	۰/۰۱۸۹	۰/۰۱۰۰	۰/۰۰۳۳۳	۱	۰/۰۲۲۶	۰/۰۰۳۶۸	۰/۰۲۰۶	۰/۰۰۸۲۷	۲۰	۱۰	
۰/۰۱۱۱	۰/۰۱۷۶	۰/۰۱۰۶	۰/۰۰۵۲۱	-1							

تخریب کنندگی نمونه و زمان‌بر بودن دشوار باشد اما رتبه‌گذاری مجموعه‌هایی از نمونه به نسبت آسان و قابل اطمینان باشد، روش نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار روش مناسبی است. یکی از برتری‌های این روش این است که برآوردهای میانگین جامعه حاصل از آن کاراتر از نمونه‌گیری تصادفی ساده عمل می‌کند. همچنین برآوردهای بیزی پارامترهای توزیع پاریتو بر اساس مشاهدات حاصل از این طرح نمونه‌گیری ارائه شد و با برآوردهای حاصل از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده مقایسه گردید. نتایج مقایسه نشان از برتری روش نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار بر روش تصادفی ساده داشت.

تقدیر و تشکر

نویسنده‌گان مقاله لازم می‌دانند از زحمات سر دبیر مجله و داوران محترم که با نقطه نظرات و پیشنهادات سازنده‌ی خود، باعث بهبود مقاله شدند تقدیر و تشکر کنند.

مراجع

زمانزاده، ا.، احمدی، ج. (۱۳۹۰)، بازه اطمینان ناپارامتری با ضریب اطمینان دقیق برای چندک‌های جامعه بر اساس نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار، مجله علوم آماری، جلد ۵، ۳۳-۲۹.

۲۱۶ نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار

امینی، م.، ارقامی، ن. (۱۳۸۷)، دقت برآورد نسبتی در نمونه‌گیری از مجموعه‌ی رتبه‌دار، گزیده مطالب آماری، سال ۱۹، ۴۷-۲۷.

Abu-Dayyeh, W., Assrhani, A. and Ibrahim, K. (2011), Estimation of the Shape and Scale Parameters of Pareto Distribution Using Ranked Set Sampling, *Statistical Papers*, **54**, 207-225.

Al-Saleh, M. F. and Al-Hadrami, S. A. (2003), Estimation of the Mean of the Exponential Distribution Using Moving Extremes Ranked Set Sampling, *Statistical Papers*, **44**, 367-382.

Al-Ssaled, M. F., Al-Shrafat, K. and Muttlak, H. (2000), Bayesian Estimation Using Ranked Set Sampling, *Biometrical Journal*, **42**, 489-500.

Berger, J. O. (1985), *Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis*, Second Edition, Springer, New York.

Chang, Y. C, Hung, W. L. (2007), LINEX Loss Functions with Applications to Determining the Optimum Process Parameters, *Quality & Quantity* , **41**, 291-301.

Chen, Z., Bai, Z. and Sinha, B. K. (2003), *Ranked Set Sampling: Theory and Applications*, Springer, New York.

Hogg, R. V. and Klugman, S. A. (1984), *Loss Distributions*, Wiley, New York.

Keating, J. P., Mason, R. L. and Sen, P. K. (1993), Pitman Measure of Closeness: A Comprision of Statistical Estimators, *Society for Industrial and Applied Mathematics*, Philadelphia.

McIntyre, G. A. (1952), a Method for Unbiased Selective Sampling Using Ranked Sets, *Australian Journal of Agriculture Research*, **3**, 358-390.

- McIntyre, G. A. (1952), A Method for Unbiased Selective Sampling Using Ranked Sets, *Australian Journal of Agriculture Research*, **3**, 358-390.
- Mode, N., Conquest, L. and Marker, D., (1999), Ranked Set Sampling for Ecological Research: Accounting for the Total Cost of Sampling, *Environmetrics*, **10**, 179-194.
- Nussbaum, B. D. and Sinha, B. K. (1997), Cost Effective Gasoline Sampling Using Ranked Set Sampling, *In Proceedings of the Section on Statistics and the Environment*, American Statistical Association, Alexandria, VA. 83-87.
- Patil, G. P., Sinha, A. K. and Taillie, C., (1999), Ranked Set Sampling: A Bibliography, *Environmental and Ecological Statistics*, **6**, 91-98.
- Pitman, E. J. G. (1937), The Closest Estimates of Statistical Parameters, *Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, **33**, 212-222.
- Rizzo, L. (2009), New Goodness-of-Fit Tests for Pareto Distributions, *ASTIN Bulletin*, **39**, 691-715.
- Sadek, A., Sultan, K. S. and Balakrishnan, N. (2013), Bayesian Estimation Based on Ranked Set Sampling Using Asymmetric Loss Function, *Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society*, to appear.
- Shaibu, A. B. and Muttlak, H. A. (2004), Estimating the Parameters of the Normal, Exponential and Gamma Distributions Using Median and Extreme Ranked Set Samples, *Statistica*, **64**, 75-98.
- Sinha, B. K., Sinha, B. K. and Purkayastha, S. (1996), On Some Aspects of Ranked Set Sampling for Estimation of Normal and Exponential Parameters, *Statistical Decisions*, **14**, 223-240.

۲۱۸ نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار

- Varian, H. R. (1975), A Bayesian Approach to Real Estate Assessment,
In Finberg, S. E., Zellner, A., eds., *Studies in Bayesian Econometrics
and Statistics in Honor of Leonard J. Savage*, Amesterdam: North-
Holland, 195-208.
- Yu, P. L. H. and Lam, K. (1997), Regression Estimator in Ranked Set
Sampling, *Biometrics*, **53**, 1070-1080.